UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
FACULTAD DE MEDICINA

**PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE CARIES
TEMPRANA DE LA INFANCIA EN POBLACIÓN
URBANO-RURAL DE PANGUIPULLI**

TESIS DOCTORAL

SERGIO A URIBE ESPINOZA

Valdivia - Chile

2016

**Prevalencia y factores de riesgo de caries
temprana de la infancia en población urbano-
rural de Panguipulli**

Tesis presentada a la Facultad de Medicina de la
Universidad Austral de Chile en cumplimiento parcial
de los requisitos para optar al grado de Doctor en
Ciencias Médicas

Por

Sergio Andrés Uribe Espinoza

Valdivia - Chile

2016

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE FACULTAD DE MEDICINA

INFORME DE APROBACIÓN DE TESIS DE DOCTORADO

La Comisión Evaluadora de Tesis comunica al Dr. Miguel Concha.,
Director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina que la
tesis de doctorado presentada por el candidato

SERGIO ANDRÉS URIBE ESPINOZA

Ha sido aprobada en el examen de defensa de Tesis rendido el día
_____ de 2016, como requisito para optar al grado de Doctor en
Ciencias Médicas. Y, para que así conste para todos los efectos firman:

Profesor Patrocinante **Dr. Oscar Arteaga** _____

Profesor Copatrocinante **Dr. Mario Calvo G.** _____

Comisión Evaluadora de Tesis:

Dra. Carola Otth L. -----

Dra. Andrea Baez M. -----

Dr. Mauricio Barría P. -----

Dr. Vicente Aránguiz F. -----

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1 LISTADO DE PUBLICACIONES ASOCIADAS.....	XI
2 LISTA DE PRESENTACIONES EN CONGRESOS 2011-2016.....	XIII
3 DEDICATORIA.....	XV
4 AGRADECIMIENTOS.....	XVI
5 ABREVIATURAS Y SIGLAS.....	XVII
6 RESUMEN.....	XVIII
7 ABSTRACT.....	XX
1 INTRODUCCIÓN.....	1
1.1 Relevancia de la caries temprana de la infancia para la salud oral.....	7
1.2 Fundamentación del problema a investigar.....	10
1.3 Marco Teórico: La caries temprana de la infancia como problema de salud pública. 14	
1.3.1 El contexto de la salud bucal.....	14
1.3.2 Definición de la caries dental.....	15
1.3.3 Definición y características clínicas de la caries temprana de la infancia.....	16
1.3.4 La medición de la caries.....	19
1.3.5 Criterios utilizados para la caries temprana de la infancia.....	25
1.3.6 Estudios de prevalencia de la caries temprana de la infancia.....	26
1.3.7 Estado histórico de caries en América Latina.....	32
1.3.8 Consecuencias de la caries temprana de la infancia.....	33
1.3.9 Costos asociados al tratamiento de la caries temprana de la infancia.....	34
1.3.10 Resumen sobre la prevalencia de CTI.....	36
1.4 Factores de riesgo en el desarrollo de la caries temprana de la infancia.....	38
1.4.1 Definición de riesgo y factor de riesgo.....	39
1.4.2 Factores de riesgo de la CTI.....	40
1.5 Fundamentación de la zona geográfica del estudio.....	57

1.6 Justificación del estudio.....	57
1.7 OBJETIVOS.....	59
1.7.1 Objetivo general.....	59
1.7.2 Objetivos específicos.....	59
1.7.3 Hipótesis de estudio.....	60
2 MATERIALES Y MÉTODOS.....	61
2.1 Diseño del estudio.....	61
2.2 Participantes.....	61
2.2.1 Características geográficas de la comuna de Panguipulli.....	62
2.2.2 Características demográficas de la comuna de Panguipulli.....	63
2.3 Muestra del estudio.....	65
2.3.1 Población objetivo.....	65
2.3.2 Criterios de inclusión y exclusión.....	65
2.3.3 Estimación del tamaño muestral para determinar la prevalencia puntual de CTI	65
2.3.4 Tipo de muestreo.....	66
2.3.5 Reclutamiento.....	67
2.3.6 Estimación del tamaño muestral para asociar factores de riesgo.....	67
2.4 Definiciones de variables.....	67
2.4.1 Variable dependiente.....	68
2.4.2 Variables independientes.....	69
2.5 Fuente de datos.....	75
2.5.1 Calibración y acuerdo inter e intraobservadores para la evaluación de CTI.....	75
2.5.2 Examen clínico.....	76
2.5.3 Diseño y adaptación del cuestionario para la evaluación de factores de riesgo..	79
2.5.4 Tabulación y almacenamiento de datos del examen clínico y de factores de riesgo.....	80

2.6	Análisis estadísticos.....	81
2.6.1	Análisis descriptivos demográficos.....	82
2.7	Aspectos éticos.....	82
2.7.1	Protocolo del estudio.....	82
2.7.2	Consentimiento comunitario.....	82
2.7.3	Consentimientos individuales.....	83
2.7.4	Financiamiento.....	83
2.7.5	Incentivos a los participantes.....	84
2.7.6	Estimación de la prevalencia puntual de CTI.....	84
2.7.7	Análisis de factores de riesgo.....	85
3	RESULTADOS.....	89
3.1	Resultados demográficos.....	89
3.2	Descripción de la prevalencia de caries temprana de la infancia.....	90
3.2.1	Prevalencia puntual e IC.....	90
3.2.2	Severidad de CTI.....	93
3.2.3	Actividad de CTI.....	96
3.3	Análisis bivariados de riesgo.....	97
3.3.1	Razones de prevalencia de los factores de riesgo para la CTI.....	97
3.3.2	Independencia de las proporciones.....	99
3.4	Modelo de análisis multivariado.....	106
4	DISCUSIÓN.....	108
4.1	Prevalencia, severidad y actividad.....	108
4.2	Factores de riesgo de CTI en los preescolares de Panguipulli.....	111
4.3	Limitaciones del presente estudio.....	116
4.4	Fortalezas del presente estudio.....	119
4.5	Interpretación y relevancia de los resultados del presente estudio.....	119
5	CONCLUSIONES.....	121

6 BIBLIOGRAFÍA.....	122
7. ANEXOS.....	155
7.1 Análisis estadísticos.....	155
Descriptivo.....	155
Multivariado.....	181

Índice de figuras

Fig 1. Presentación clínica de los casos, desde un diente sano (a), pasando por lesiones no cavitadas (b), cavitadas (c, d, e) y destrucción extensa (e, f). Los criterios diagnósticos tradicionales detectan solo desde la caries cavitada (c) en adelante.....	16
Fig 2. Presentación clínica de la caries temprana de la infancia donde se observa la actividad de caries en la cara vestibular de los dientes anterosuperiores mientras que los anteroinferiores se ven relativamente indemnes.....	18
Fig 3. Zona geográfica y colegios y jardines participantes de la comuna de Panguipulli.....	60
Fig 4. Prevalencia puntual de CTI por género y total. Línea de error = 95% IC.....	87
Fig 5. Desglose de la severidad por diente, Panguipulli, 2013-2014.....	91
Fig 6. Placa dental, cepillado, pasta y mamadera diurna. Se observa que se rechaza la hipótesis de independencia en aquellos niños que están libres de caries y sin caries.....	97
Fig 7. Mamadera diurna, jugo, bebida y control odontológico. Se observa que se rechaza la hipótesis de independencia en aquellos niños que no consumen bebidas azucaradas y están libres de caries.....	98
Fig 8. Control médico, huerta, agua potable, luz. Se observa que se rechaza la hipótesis de independencia en aquellos niños con huerta y sin caries.....	99
Fig 9. Familia mapuche, apoderado mapuche, rural, previsión. Se observa que se rechaza la hipótesis de independencia en aquellos niños con previsión distinta al	

grupo A y sin caries. Este factor se consideró como proxy de nivel socio-económico.....100

Fig 10. Idiomas en casa, educación madre, padre y tipo de vivienda. Si bien se observa que se rechaza la independencia entre las variables idioma mapuche y caries, los casos son mínimos como para considerar esta independencia.....101

Índice de tablas

Tabla 1. Nombres con que se denomina a la caries temprana de la infancia.....	17
Tabla 2. Índice ceod de severidad de caries en dientes temporales.....	23
Tabla 3. Prevalencia y criterios diagnósticos de CTI reportada en estudios internacionales.....	26
Tabla 4. Estudios de prevalencia de CTI en Chile.....	30
Tabla 5. Resumen factores de riesgo de la CTI. Asociación + indica riesgo cuando está presente y – cuando está ausente.....	54
Tabla 6. Términos para el cálculo de la razón de prevalencia (RP) y su intervalo de confianza al 95% (IC95%).....	83
Tabla 7. Descripción demográfica de los 330 participantes del estudio.....	86
Tabla 8. Prevalencia por género y edad, Panguipulli 2013-2014. Número (porcentaje por edad).....	88
Tabla 9. Proporción de niños cuyas familias se declaran mapuches y presencia de caries. ($p=0.0036$).....	88
Tabla 10. Severidad de la caries temprana de la infancia en la población preescolar de Panguipulli, 2013-2014. Se muestran los promedios (desviación estándar).....	90
Tabla 11. Actividad de caries por sexo y edad en porcentaje (desviación estándar).	92
Tabla 12. Actividad y presencia de CTI.....	92
Tabla 13. Razones de prevalencia. Con * aquellas con un límite inferior del IC 95% > 1.....	94
Tabla 14. Análisis bivariado de la independencia de variables.....	96

Tabla 15. Modelo multivariado de regresión logística para factores de riesgo de CTI en la población de Panguipulli.....	103
---	-----

1 LISTADO DE PUBLICACIONES ASOCIADAS

- Mariño, R., Ramos-Gómez, F., Manton, D.J., Onetto, J.E., Hugo, F., Feldens, C.A., Bedi, R., Uribe, S., Zillmann, G., 2016. The future of pediatric dentistry education and curricula: a Chilean perspective. *BMC Oral Health* 17, 20. doi:10.1186/s12903-016-0251-7.
- Uribe, S. PhD Thesis Early Childhood Caries and Risk Factors in a population with rural and ethnic component. Raw dataset. Open Science Framework, 28 Apr. 2016. Web. <http://doi.org/10.17605/OSF.IO/S7DEJ>
- Maldupa, I., Toloza, P., Aguila, J., Uribe, S.E., 2015. Transcultural adaptation and reliability of the spanish version of a questionnaire of oral hygiene. *Journal Oral Of Research* 4, 88-94. doi:10.17126/joralres.2015.020.
- Maldupa, I., Uribe, S., Brinkmane, A., Senakola, E., Krumina, K., 2014. Fluorīdu lietošanas vadlīnijas Latvijā. Riga Strandins University Bulletin. http://www.stomatologijasinstituts.lv/uploads/attachments/Fluoridu_lietosanas_vadlinijas_Latvija.pdf.
- Uribe, S., Gómez, S.S., Ortíz, M.E., 2014. Systematic review on the use of fluoride toothpastes in preschool children. *Medwave* 14, e5773-e5773. doi:10.5867/medwave.2014.5773.
- Uribe, S., Lara-Abarzúa, F., Ruiz-Miranda, N., Bravo-Gajardo, K., Huichaman, D., 2015. Diagnostic agreement between radiologist, dentist and dental students for radiographic detection of approximal

- caries. Journal Of Oral Research 4, 161-166.
doi:10.17126/joralres.2015.034.
- Uribe, S., Provoste, P., Jara, L., Rodriguez, M., Peigna, G., 2014. Estudio de casos y controles de factores de riesgo de caries temprana de la infancia en población rural. Ciencia Odontológica 11, 138-147.
- Uribe, S., Rodriguez, M., Peigna, G., Provoste, P., Jara, L., 2013. Prevalencia de caries temprana de la infancia en zona rural del sur de Chile, 2013. Ciencia Odontológica 10, 97-104.
- Martignon, S., Uribe, S., Pulido, A., Cortes, A., Gamboa, L., 2013. Comparison between Radiographic and Visual-Tactile Exams for the Detection and Assessment of Proximal Caries. Universitas Odontologica, Universitas Odontologica 32, 25-31.

2 LISTA DE PRESENTACIONES EN CONGRESOS 2011-2016

Uribe S. New insight about the interrelationship among oral biofilms, sugars and dental caries. Riga Stradiņš University Stomatology Institute. Riga, Letonia, feb 2016 (conferencia)

Uribe S. Conferencia "Nueva visión del rol del Biofilm en la caries dental". Congreso Internacional de la Facultad de Odontología UNAM - AMIC. 8 de mayo 2015, Ciudad de México, México. (conferencia)

Uribe S. Caries temprana de la infancia, aspectos clínicos. 19 julio 2014. Colegio de Cirujanos-Dentistas de Antofagasta. Antofagasta, Chile (conferencia)

Rodríguez MF, Peigna GB, Provoste PR, Jara LS, Uribe S. Prevalencia de caries temprana de la infancia en población rural. 7 de octubre de 2013. XXV Reunión Anual División Chile International Association for Dental Research, Chile. Santiago. (Póster)

Provoste PR, Jara LS, Rodríguez MF, Peigna GB, Uribe S. Factores de riesgo de caries en preescolares de población rural. 7 de octubre de 2013. XXV Reunión Anual División Chile International Association for Dental Research, Chile. Santiago. (Póster)

Uribe S. "¿Porqué la Caries continúa siendo la enfermedad más prevalente de la humanidad?" Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. 25 de agosto, 1 hr. (Conferencia)

Uribe S. "Evidencia de la Intervención temprana de caries". Jornadas JUNAEB, Valdivia, Chile. 20 marzo 2012. 1 hrs. (Conferencia)

Vergara C, Burdach C, Uribe S. Sealants with/without fluoride are equally effective to prevent Dental Caries. IADR/LAR General Session (June 20-23, 2012) (Iguaçu Falls, Brazil) June 20-23, 2012, Iguaçu Falls, Brazil.

3 DEDICATORIA

A mi amada esposa Ilze.

4 AGRADECIMIENTOS

En primer lugar agradezco a mi profesor guía, el Dr Oscar Arteaga. Sin su paciencia, consejos y su inagotable generosidad académica esta tesis no habría sido posible.

Agradezco a los miembros del comité de tesis, Dra Carola Otth, Dra Andrea Baez Dr Vicente Aránguiz y Dr Mauricio Barría. Sus críticas, recomendaciones y sugerencias permitieron mejorar de manera significativa esta investigación.

Al Dr Miguel Concha y la Dra Paola Krall por su apoyo y la secretaría de la Escuela de Graduados, Jacqueline Vidal, por su paciencia.

Al Dr Rodrigo Mariño, (UniMelb. A Mauricio Huenulef, Gerardo Matus Rodríguez (C. Educ. Panguipulli), Claudia Venegas (JUNJI), Richard Ríos e Ivonne Jelves (SEREMI Los Ríos), Ernesto Espinoza Navarrete (CONADI Los Ríos) y Carolina Rodríguez (UACH).

A Mauricio Rodriguez, Gonzalo Peigna, Patricia Provoste y Leonardo Jara., Fernando Massoglia y Marco Cornejo, Sergio Thiers y Felipe Gómez (SS Panguipulli).

A Francisco Javier Ramos y Colgate-Palmolive Company por la donación de productos para los niños participantes.

Al Dr Leo Bacigalupe del curso ECEV-424 Bioestadística avanzada.

Un agradecimiento especial a quienes han sido mis referentes y modelos académicos, mis queridos Prof Santiago Gómez y Adriana Weber y los Prof JE Onetto y Marie-Therese Flores.

A mis padres, Sergio y María Teresa, todo mi amor y cariño y a mis hermanos y sus familias.

A todos los profesores, directivos, apoderados y por supuesto a los niños de Panguipulli que participaron en esta investigación.

5 ABREVIATURAS Y SIGLAS

CTI	Caries temprana de la infancia
ceod	índice de dientes cariados, extraídos u obturados por caries. Es sinónimo de c3eod
c1c3eod	índice de caries que incluye las lesiones no cavitadas, cavitadas, obturados o perdidos por caries
c3eod	índice de caries que incluye solo dientes con caries cavitadas, obturados o perdidos por caries
MINSAL	Ministerio de Salud de Chile
c1	lesión de caries no cavitada
c2	caries cavitada a nivel de esmalte
c3	caries cavitada a nivel de dentina
o	diente que ha sido obturado por caries
p	diente que ha sido perdido por caries
d	diente
AAPD	American Association of Pediatric Dentistry
OMS	Organización Mundial de la Salud. Al utilizarse como criterio diagnóstico se refiere al criterio diagnóstico de caries que registra aquellos dientes o superficies con lesiones cavitadas
ICDAS	International Caries Detection and Assessment System
IC95%	Intervalo de confianza al 95%
OR	odds ratio
RP	Razón de prevalencia
ppm	partes por millón
gl	grados de libertad
p	probabilidad. Aquellas bajo 0.05 fueron consideradas significativas

6 RESUMEN

Objetivo: determinar la prevalencia y factores de riesgo asociados a la caries temprana de la infancia (CTI) en la población urbana rural de la comuna de Panguipulli.

Materiales y métodos. Estudio de corte transversal. Cuatro examinadores calibrados ($\kappa = 0.82$) utilizaron los criterios de la OMS (ceod) modificados para incluir lesiones no cavitadas (c1). Se consideró CTI utilizando el criterio de la AAPD. Se invitó a participar a los padres y preescolares matriculados al 2013 en la comuna de Panguipulli. Se obtuvo la autorización del comité de ética de investigación del Servicio de Salud Valdivia. El tamaño muestral requerido fue de 271 asumiendo una prevalencia del 70% y un error del 5%. Los datos de riesgo se obtuvieron mediante un cuestionario administrado personal o telefónicamente. Se realizaron análisis univariados, bivariados y multivariados para identificar el mejor modelo explicativo de CTI en esta población.

Resultados: La muestra final fue de 330 niños con 178 niños y 152 niñas. La edad promedio (desviación estándar) fue 4.4(0.74) años en niños y 4.3(0.74) en niñas. La prevalencia de CTI fue de 66.4% IC95%[61.3, 71.5]. Luego de excluir variables con bajo poder explicativo, el modelo final que mejor explica la CTI en esta población incluyó la presencia de placa dental visible, falta de huerta y consumo de bebidas azucaradas.

Conclusión: La prevalencia de CTI en la comuna de Panguipulli es mayor a la media nacional. Esto sugiere que la intervención debe comenzar antes de los 6 años. Los factores de riesgo asociados sugieren

la necesidad de intervenciones sociales. El hallazgo que la falta de huerta sea un factor de riesgo abre alternativas interesantes de intervenciones preventivas en comunidades de bajo nivel socioeconómico.

Descriptor: caries temprana de la infancia, preescolares, prevalencia, desigualdades de salud oral, factores de riesgo.

7 ABSTRACT

Aim: to assess the prevalence and identify associated risk factors in an urban-rural population from the Panguipulli, a community in the southern Chile.

Materials and methods: Cross sectional study. Four calibrated examiners ($\kappa = 0.82$) used the WHO criteria (dmft) modified including non-cavitated lesions / enamel (c1) and cavitated (c3). ECC was considered using the AAPD criteria. All preschool children from Panguipulli enrolled in march 2013 were eligible and their parents were invited. This study was approved by the Scientific Ethics Committee of the Health Service of Valdivia. Sample size required was 271, with the following assumptions: 70% prevalence of ECC, alpha error = 0.05. A interview- and telephone questionnaire was administered to 213 parents and caregivers aimed to identify risk factors. Uni-bi and multivariate analysis was performed to identify the best explicative model for ECC in this sample population.

Results: The final sample (330 preschools) consisted of 178 boys and 152 girls. The mean age(standard deviation) was 4.4(0.74) years in male and 4.3(0.74) years in women. ECC prevalence was 66.4% IC95%[61.3, 71.5]. After excluding items with low explicative power, significant associations were reported for visible dental plaque, lack of vegetable garden and sugar-containing soda.

Conclusions: The prevalence of early childhood caries in rural areas of southern Chile is higher than national average. This suggests that intervention at 6 years is late, hence earlier intervention is required.

Associated risk factors suggest the necessity of social interventions. The finding of the lack of vegetable garden as risk factor open new alternatives for the prevention of ECC in low socioeconomic status communities.

Keywords: early childhood caries, preschool, prevalence, oral health disparities, risk factors.

1 INTRODUCCIÓN

La caries temprana de la infancia (CTI) es una forma severa de caries dental que afecta a los menores de cinco años (Vadiakas, 2008). Corresponde a la presencia de uno o más dientes afectado con caries, obturado o perdido por caries en dientes temporales en niños y niñas de 71 meses de edad o menos (AAPD, 2008). Es la patología más común en la infancia, con cinco veces más casos de asma y siete veces más casos que fiebre (Evans y Kleinman, 2000). La prevalencia global de CTI varía entre el 40 al 90% de la población infantil (Petersen, 2005) y en países desarrollados como EEUU, tres de cinco preescolares con caries no reciben tratamiento (Ba et al., 2007). Si bien la caries puede afectar a todos los niños, ha mostrado ser más prevalente en minorías, y en niños más pobres, de origen indígena, de minorías étnicas e inmigrantes y refugiados. La magnitud, severidad y desigualdad con que afecta a la población hace que la CTI sea el principal problema de salud pública en odontología tanto a nivel global (Rugg-Gunn y Do, 2012) como en Chile (MINSAL, 2010). La CTI tiene impacto en la salud de los niños y tiene consecuencias que se mantienen presentes por toda la vida de las personas.

La disminución de la caries infantil que se había observado hasta los años 90 se ha detenido (Bönecker y Cleaton-Jones, 2003) e incluso ha comenzado a revertirse (Haugejorden y Birkeland, 2002). Aun cuando la caries es prevenible (Albino y Tiwari, 2016; Sheiham y James, 2015),

la prevalencia y severidad de daño dental producto de la caries se está polarizando, con una menor proporción de la población que está experimentando la mayor carga de esta patología bucal (Narvai et al., 2006). Dicha polarización ha sido reportada tanto en países de ingreso medio como Brasil (Nunes et al., 2014), Chile (Hoffmeister et al., 2016) y de ingreso alto como Italia (Nobile et al., 2014). Todos los estudios epidemiológicos coinciden en que los niños más afectados son aquellos con desventajas sociales, como provenir de familias pobres, inmigrantes, con menor acceso a educación o servicios sanitarios y particularmente aquellos de familias que reconocen pertenecer a pueblos originarios (Al-Jewair y Leake, 2010; Congiu et al., 2014; Masumo et al., 2012; Njoroge et al., 2010; Nunn et al., 2009; Prakash et al., 2012; Singh et al., 2012).

La CTI tiene efectos significativos para la salud general en los preescolares y sus consecuencias acompañan al individuo por toda su vida. Los preescolares con caries pierden más días de jardín infantil o colegio (Hollister y Weintraub, 1993) y consecuentemente tienen peor rendimiento escolar (Jackson et al., 2011). Además tienen una dieta deficiente que los hace propensos a la anemia (Bansal et al., 2016) y obesidad (Dos Santos Junior et al., 2014), lo cual lleva a que los niños con caries tengan alteraciones en su desarrollo físico (Acs et al., 1992) y psicomotor (Núñez et al., 2015). Asimismo, los niños con CTI tienen entre dos a cuatro veces más riesgo de tener caries en su dentición definitiva (Li y Wang, 2002) y tienen en promedio 14 dientes más con

daño de caries en comparación a niños que no tuvieron caries en su dentición temporal (Jordan et al., 2016). En países desarrollados como Inglaterra (Templeton, 2014) o EEUU (Ladrillo et al., 2006) la CTI es la principal causa de hospitalización de urgencia. Mientras, en Chile, el año 2002 se realizaron 117.989 atenciones de urgencia dental (MINSAL, 2002).

La rehabilitación de un niño con CTI cuesta desde USD575¹ (Milnes et al., 1993) hasta más de USD7000 (Rashewsky et al., 2012) por lo que está fuera del alcance de la mayoría de las familias de países subdesarrollados o en vías de desarrollo (Yee y Sheiham, 2002). Inclusive aquellos niños que reciben tratamiento rehabilitador, experimentan un deterioro significativo en su calidad de vida (Casamassimo et al., 2009) , deterioro que también afecta a sus padres (Filstrup et al., 2003). Hasta el momento no existe evidencia de efectividad de la rehabilitación para disminuir la incidencia de la CTI (Twetman y Dhar, 2015). Por esto, la caries en los menores de 6 años tiene un impacto significativo tanto en la salud del niño como en la calidad de vida y economía familiar.

Existen numerosos factores de riesgo asociados de manera significativa a la CTI, los que pueden ser biológicos, conductuales, socioeconómicos y culturales (Harris et al., 2004). Estos factores de riesgo han sido identificados principalmente mediante modelos que asocian la presencia o ausencia de CTI con un factor de riesgo, en lo que se

¹en dólares al 2015 ajustado según el producto interno bruto nominal por el real

conoce como modelos bivariados. Es así como se ha reportado la asociación entre CTI y la presencia de defectos de esmalte (Oliveira et al., 2006), el recuento de *S. mutans* (Parisotto et al., 2010), lactobacilos (Gao et al., 2014), el contenido de flúor en el agua potable o el uso de pasta dental fluorada (Mahesh et al., 2013).

Sin embargo, recientes revisiones sistemáticas indican que los factores de riesgo asociados a la caries temprana de la infancia difieren entre distintas poblaciones (Harris et al., 2004; Leong et al., 2012). Los grupos sociales más deprivados (Engelmann et al., 2016), de comunidades rurales (Dogar et al., 2011) y particularmente aquellos compuestos por etnias de pueblos originarios (Alves Filho et al., 2014) presentan una mayor prevalencia de CTI. Un reciente estudio epidemiológico de salud oral en preescolares en Valdivia estimó la prevalencia de caries temprana de la infancia en 50.8%. Una de las observaciones del estudio fue que existían diferencias entre colegios públicos (53.5%) y privados (0%) (Nauto et al., 2012). Asimismo, Zaror et al. (2011), en una muestra por conveniencia de pacientes de un consultorio público, detectaron diferencias en la frecuencia de caries temprana de la infancia entre pacientes provenientes de localidades rurales (81%) y urbanas (66%). Esta evidencia local, en conjunto con la evidencia internacional, indica que existen factores de riesgo que actúan de manera específica en distintos grupos poblacionales, sugiriendo que esta mayor prevalencia podría deberse más a la acción de factores socioculturales que biológicos o que estas poblaciones

comparten un factor en común, usualmente la pobreza (Bhopal, 1997). Esto explicaría la falta de efectividad de las intervenciones enfocadas en factores biológicos. Al respecto, Fontana et al. (2011) mediante un estudio longitudinal de un año de duración en 329 niños en Indiana, EEUU, encontró que en una población cultural, social y étnicamente diversa existen distintos factores de riesgo de caries temprana de la infancia para los preescolares afroamericanos, hispanicos y caucásicos (Fontana et al., 2011). Este resultado sugiere que no existe un programa único preventivo para la caries temprana de la infancia sino que se requieren identificar aquellos factores de riesgo que actúan en subgrupos poblacionales a objeto de entregar atención y prevención focalizada. Considerando que el actual sistema de atención en salud oral tiene una capacidad limitada para proveer los cuidados preventivos o restauradores que la población requiere, particularmente en los preescolares (Mouradian et al., 2000), la identificación de este grupo de riesgo o factores de riesgo que afecten a una población en particular se vuelve una necesidad urgente .

Toda esta evidencia ha llevado a la Organización Mundial de la Salud y a la Federación Dental Internacional a señalar que es necesario cambiar el paradigma de la prevención y tratamiento de la caries dental, desde el tradicional enfoque rehabilitador del paciente hacia acciones preventivas a nivel poblacional (Benzian y Williams, 2015). Considerando que en Chile hay una aumento drástico de la prevalencia

de caries en los niños, a los 2 años, sólo un 20% tiene caries (MINSAL et al., 2009, 2007) , porcentaje que aumenta al 80% a los 6 años (Del Valle y MINSAL, 2010) y llega finalmente a más del 90% en la población adulta (Urzua et al., 2012) es que la población preescolar es el grupo ideal para enfocar los programas e intervenciones preventivas. Sin embargo, el umbral de diagnóstico de caries tradicionalmente utilizado por las investigaciones se orienta a identificar sólo aquellas superficies cavitadas, lo que se conoce como la historia de caries. Esto representa una etapa tardía de la enfermedad, donde solo es posible intervenir de manera quirúrgica-rehabilitadora para reponer los tejidos dentarios perdidos.

Asimismo, dado que la mayor prevalencia de la caries temprana de la infancia se manifiesta en poblaciones ya sea deprivadas, rurales o con un alto componente de etnicidad (AAPD, 2008), se requieren estudios enfocados en estas poblaciones. Por esto, el objetivo del presente estudio es determinar la prevalencia de la caries temprana de la infancia considerando la presencia, severidad y actividad de caries, en una población con altos índices de ruralidad y etnicidad, para identificar factores de riesgo que expliquen la presencia de historia y actividad de caries.

Este trabajo está organizado de la siguiente manera: en el marco teórico se hará en primer lugar una revisión detallada de los estudios disponibles acerca de la prevalencia de CTI para establecer su prevalencia y severidad a nivel mundial y local. Luego, se revisará la

literatura para identificar los factores de riesgo reportados a objeto de seleccionar aquellos que se medirán en la población a estudiar. Esto dará al lector el cuadro general de los hallazgos de estudios previos, las limitaciones metodológicas inherentes a este tipo de estudios y la oportunidad, utilidad y relevancia de la presente investigación.

1.1 Relevancia de la caries temprana de la infancia para la salud oral

Una dentición sana y funcional es vital en todas las etapas de la vida al permitir funciones esenciales tales como hablar, comer, socializar y sonreír (Benzian y Williams, 2015). Si bien las enfermedades orales afectan un área limitada del cuerpo, sus consecuencias afectan al cuerpo de manera global. Así, la infección oral crónica se ha asociado a diabetes, enfermedad cardiovascular y pulmonar (Dep Health Human Serv, 2000). Asimismo, muchas enfermedades sistémicas comparten factores de riesgo comunes con otras enfermedades crónicas no transmisibles, como el consumo de azúcares con la diabetes, la obesidad y salud cardiovascular (Johnson et al., 2009).

A pesar de la inversión en salud y el desarrollo económico, la caries en los preescolares está aumentando (Bagramian et al., 2009). A este aumento se le ha llamado “la epidemia silenciosa” (Benjamin, 2010) debido a tres características de la caries en los niños pequeños: (1) los niños pueden manifestar dolor o incomodidad con cambios de apetito y sueño, lo que puede postergar el diagnóstico correcto de la infección oral; (2) la prevalencia de caries es mucho mayor en poblaciones deprimidas

socioeconómicamente, las que además tienen menor acceso a los servicios de salud por ruralidad; y (3) existe el mito que no vale la pena cuidar los dientes temporales debido a que serán recambiados por los definitivos (Louis, 2016), especialmente entre los grupos más deprivados que consideran normal que los niños tengan caries (Negro y Tyrone, 2016). Al respecto, los estudios longitudinales muestran que niños con caries en su dentición temporal tienen más caries en sus dientes permanentes (Li y Wang, 2002; Peres et al., 2016) y más severas (Jordan et al., 2016).

La caries en los dientes primarios o temporales tiene efectos graves en los niños, y sus consecuencias permanecen por toda la vida del individuo. Los niños con caries sufren de alteraciones en su función masticatoria, que provoca cambios en la dieta que los hacen propensos a alteraciones del desarrollo y limitan su masticación, fonación y socialización (AAPD, 2008). Asimismo, estos niños sufren de fiebre, dolor, abscesos (Department of Health y Human y Services, 2000) y una disminución significativa tanto en su propia calidad de vida como en la de sus padres y familiares cercanos (AAPD, 2008). También, los niños con caries temprana de la infancia tienen en promedio una diferencia de 14 dientes adicionales con caries en la dentición definitiva en comparación a niños con dientes temporales sanos (Jordan et al., 2016). A pesar del mejoramiento en general de la salud de los niños, la salud bucal de los preescolares ha empeorado en la última década tanto en los países desarrollados (Dye et al., 2011; Nobile et al., 2014) como en

aquellos en vías de desarrollo (Hoffmeister et al., 2016; Nunes et al., 2014).

En Chile la prevalencia reportada de CTI presenta discrepancias, con valores que van desde el 17% (MINSAL et al., 2009) hasta el 88% (Zaror Sánchez et al., 2011). Sin embargo, toda la evidencia disponible está de acuerdo que la mayor prevalencia se concentra en los grupos socioeconómicos más bajos, aquellos con mayor proporción de miembros de pueblos originarios, inmigrantes, o de familias con menor acceso a educación (Do, 2012). En Chile, en particular, Hoffmeister et al. atribuyen esta diferencia de prevalencia a la condición socioeconómica (Hoffmeister et al., 2016). Esto coincide con la información del Ministerio de Salud de Chile, que establece que los niños entre 2 a 4 años del nivel socioeconómico bajo tienen 2.2 veces más caries que niños del nivel socioeconómico alto (Del Valle y MINSAL, 2010). Por esto, la distribución desigual de la CTI está asociada más a factores socioculturales que biológicos (Nunes et al., 2014).

El tratamiento tradicional de la CTI requiere la participación de especialistas, cuyo acceso a los grupos más deprivados es limitado en el sector público (Unger et al., 2008). Más aun, los niños con CTI usualmente requieren tratamiento bajo anestesia general (Schroth y Smith, 2007) y aun quienes reciben tratamientos complejos presentan una alta tasa de retratamientos debido a nuevas lesiones de caries (Foster et al., 2006). El tratamiento restaurador de la CTI está fuera

del alcance de la mayoría de las familias de países de ingreso medio o bajo (Yee y Sheiham, 2002) y carece de evidencia de efectividad (Twetman y Dhar, 2015), esto es, los niños con CTI y que acceden a tratamiento rehabilitadores, suelen tener recurrencia de caries en sus dientes temporales.

A pesar de la cantidad de estudios disponibles acerca de la prevalencia, etiología y tratamiento de las enfermedades dentales en niños, es escasa la evidencia de calidad.

Habiendo hecho una revisión rápida de la evidencia que establece la magnitud del problema, su desigual distribución social, el hecho que sus consecuencias duren por toda la vida y que el enfoque tradicional restaurador sea inefectivo y caro, es que se requiere un cambio en la estrategia para abordar el problema de la caries temprana de la infancia. La Federación Dental Internacional ha llamado a resolver el problema de la caries infantil mediante acciones a nivel comunitario para alcanzar los amplios determinantes que subyacen a esta patología (Benzian y Williams, 2015). Por esto, la identificación de factores de riesgo conocidos en las poblaciones con alta prevalencia de caries se torna fundamental para elaborar estrategias comunitarias de intervención de la caries temprana de la infancia.

1.2 Fundamentación del problema a investigar

La evidencia disponible revela la naturaleza compleja y multifactorial de la caries dental, donde se combinan factores biológicos, ambientales,

conductuales y socioeconómicos (Divaris, 2015). Más aun, los estudios disponibles a la fecha coinciden en que la caries temprana de la infancia está asociada más a determinantes sociales que biológicos (Gibson y Williams, 1999; Van den Branden et al., 2012; Watt, 2007). Esto explicaría la falta de efectividad de las intervenciones preventivas basadas en la aplicación de flúor o sellantes (Twetman y Dhar, 2015) así como la falta de efectividad del enfoque restaurador-quirúrgico (Graves et al., 2004; Twetman y Dhar, 2015). Si bien es conocido el rol del biofilm dental (Marsh, 1994) y el consumo de azúcar (Sheiham y James, 2015; Peres et al., 2016) en la etiología de la caries dental, son las desigualdades socioeconómicas a nivel individual y comunitario las que facilitan o previenen la presencia de caries en menores de 6 años (Piovesan et al., 2010). Por esto, la caries temprana de la infancia actúa como “un indicador de una oportunidad de prevención perdida” (Nobile et al., 2014).

Implementar medidas preventivas y de control de la CTI, requiere conocer los factores de riesgo que actúan sobre la población, particularmente en subgrupos con alta prevalencia de CTI. Sin embargo, el diagnóstico tradicional de caries registra sólo aquellas superficies dentarias que se han cavitado (OMS, 1997). Esta cavitación representa una etapa tardía e irreversible del proceso de la caries, que sólo se puede resolver con tratamientos que restauren estas superficies, lo que es muy difícil de hacer en niños pequeños, o mediante la extracción dentaria, lo que es traumático y mutilante.

Para identificar las lesiones iniciales de caries es necesario por una parte, identificar los signos iniciales de desmineralización asociadas a las etapas tempranas de la caries, y por otra, identificar si esa lesión inicial está activa o detenida.

El registro de estas lesiones de caries no cavitadas permitiría por un lado estimar la proporción de la población que podría beneficiarse de las terapias no invasivas para el control de la caries dental (Guerrieri et al., 2012; Uribe, 2006); y por otro lado, identificar factores de riesgo asociados tanto a pacientes con historia de caries como a pacientes con caries activas. Sin embargo, hasta donde alcanza nuestro conocimiento, no hay estudios disponibles que muestren la prevalencia de CTI considerando tanto lesiones no cavitadas como cavitadas. El registrar las lesiones no cavitadas permitiría por una parte identificar aquellos factores de riesgo conocidos asociados ya sea a la presencia o ausencia de lesiones, lo que se conoce como historia de caries, pero además asociar factores a la actividad actual de caries en poblaciones con alta prevalencia de CTI. La identificación de estos factores en poblaciones de riesgo social podría servir para proponer nuevas estrategias preventivas que complementen las intervenciones ya existentes. Asimismo, la inclusión de factores sociales, a su vez, podría identificar la necesidad de incorporar nuevos actores para la prevención de la caries temprana de la infancia. Por último, esta investigación permitiría evaluar la implementación de un modelo de estudio para subgrupos poblacionales, como inmigrantes o minorías étnicas, un tema

cuya relevancia ha cobrado valor en la actualidad (Joshi et al., 2014; Pratt et al., 2014) debido a la globalización y los movimientos migratorios de la última década.

1.3 Marco Teórico: La caries temprana de la infancia como problema de salud pública

Este capítulo definirá la caries temprana de la infancia, identificando cómo se mide su prevalencia y severidad. Además se discutirán las fortalezas y debilidades de los métodos que se utilizan en su detección y registro.

1.3.1 El contexto de la salud bucal

La salud oral es un componente esencial de la salud general. Implica más que unos dientes sanos; la boca es tanto la causa como el reflejo de la salud individual y comunitaria (OMS, 2010). En humanos, existen dos denticiones, la temporal que aparece entre los 6 meses a los 2 años y medio y la permanente que aparece entre los 6 a 12 años de edad. La OMS define la salud bucal como la ausencia de dolor bucal o facial, de cáncer oral o de garganta, de infecciones o úlceras, de enfermedades periodontales, caries, pérdida dentaria así como de cualquier otra enfermedad o alteración que limite la capacidad del individuo de morder, masticar, reír, hablar o que comprometa el bienestar psicosocial (Benzian y Williams, 2015). De las enfermedades que afectan la cavidad bucal, la caries es la más común, tanto en la dentición temporal como definitiva.

1.3.2 Definición de la caries dental

La caries dental es una enfermedad que afecta a las personas donde el ácido producido por la fermentación de carbohidratos por parte de un microbioma (biofilm) supragingival disbiótico provoca la desmineralización o destrucción de superficies dentarias susceptibles (Selwitz et al., 2007). Esta desmineralización comienza a nivel submicroscópico y en condiciones de ingesta normal de azúcar, lo cual es menor al 5% de las calorías diarias totales (Moynihan, 2016), la que es reparada por los minerales disponibles en la saliva. En caso que haya una exposición constante y prolongada a azúcares, se produce un desbalance en la composición del microbioma dental, una disbiosis, que lleva al predominio de bacterias productoras de ácidos (acidogénicas) y que pueden sobrevivir en ambientes ácidos (acidúricas), las que son más eficientes en disminuir el pH en los fluidos que rodean al diente (Simón-Soro y Mira, 2015). Esto lleva a una desmineralización de las zonas superficiales y subsuperficiales del diente, desmineralización que es susceptible de detectarse mediante un examen clínico cuidadoso en una superficie dentaria limpia, seca e iluminada. Estas lesiones se denominan caries no cavitadas o c1. Una vez alcanzado cierto umbral de pérdida mineral, la superficie del diente se cavita, lo que se conoce como caries cavitada. Esta cavitación puede involucrar sólo esmalte (lesiones c2) o lo que es más frecuente, esmalte y dentina (c3). Esta cavitación es importante desde el punto de vista clínico, ya que marca el momento en que la desmineralización es irreversible, por lo que a

partir de este período ya no es posible aplicar medidas preventivas sino solo restauradoras.

La caries se refiere tanto al proceso como a la lesión del diente. Por un lado el proceso es invisible al examen clínico, lo único que se puede detectar son los signos de la actividad metabólica del biofilm, al igual como la úlcera péptica es la manifestación de un desbalance microbiológico-bioquímico de la pared gástrica.

La caries puede afectar tanto a los dientes temporales o de leche, que erupcionan desde los 6 a los 33 meses de edad, y a los permanentes, que comienzan a erupcionar a partir de los 72 meses (6 años) de las personas.

1.3.3 Definición y características clínicas de la caries temprana de la infancia

La caries temprana de la infancia (CTI) corresponde a la presencia de una o más caries, cavitadas o no cavitadas, o de restauraciones debidas a caries o la pérdida dentaria debido a caries en uno o más dientes temporales en niños y niñas de 71 meses de edad o menos (Drury et al., 1999). Las características clínicas se muestran en la Figura 1 donde se observan las distintas etapas desde los estadios subclínicos, de lesión no cavitada a lesión cavitada y luego la extensa destrucción.

Figura 1. Presentación clínica de los casos, desde un diente sano (a), pasando por lesiones no cavitadas (b), cavitadas (c, d, e) y destrucción extensa (e, f). Los criterios diagnósticos tradicionales detectan solo desde la caries cavitada (c) en adelante.

En la Figura 1.c. se observan las características de una lesión activa, con una superficie blanquecina y opaca, en contraste a las lesiones detenidas que se observan en la figura f, con aspecto oscuro y brillante. La denominación CTI agrupa otros nombres, como caries del biberón, caries rampante o caries de inicio precoz cuyos equivalentes en la literatura están en la Tabla 1.

Tabla 1 Nombres con que se denomina a la caries temprana de la infancia.

Inglés	Español
Rampant caries	Caries rampante
Nursing caries	Caries del bebé
Baby bottle tooth decay	Caries del biberón
	Caries de inicio precoz
	Caries de infancia temprana
Baby bottle Syndrome	Síndrome de la mamadera

La CTI tiene características que la hacen distinta de la caries en la dentición permanente: (1) debido a que el esmalte de los dientes temporales es de menor grosor en comparación a los dientes permanentes, la CTI alcanza la cavitación en menos tiempo, usualmente entre dos a seis meses; y (2) tiene un patrón característico que afecta la cara vestibular de dientes anterosuperiores y oclusal de molares, mientras que los dientes anteroinferiores se observan con menor daño debido al efecto protector del labio inferior, como se observa en la Figura 2.

Figura 2. Presentación clínica de la caries temprana de la infancia donde se observa la actividad de caries en la cara vestibular de los dientes anterosuperiores mientras que los anteroinferiores se ven relativamente indemnes.

El término CTI severa es una subclasificación que identifica la presencia de a lo menos un diente cariado, obturado o perdido por caries en menores de 3 años o la suma de dientes cariados, obturados o perdidos ≥ 4 a los 3 años, ≥ 5 a los 4 años o ≥ 6 entre los 3 a 5 años (AAPD, 2008).

1.3.4 La medición de la caries

La epidemiología mide la distribución y determinantes de la enfermedad o condiciones de salud adversas en las personas (Last, 2001). Para medir el estado de salud o enfermedad se requiere asumir que la aplicación de la epidemiología es consistente con el uso de definiciones estandarizadas del caso así como de criterios diagnósticos.

Hay que reconocer el avance que significó que en 1999 se agrupasen distintos términos bajo la definición de consenso de caries temprana de la infancia (Drury et al., 1999). Por otro lado, el objetivo de la definición debería además prestar utilidad para la planificación de intervenciones que permitan controlar la patología. Es así como definiciones diagnósticas de los estadios más tempranos de la enfermedad permiten implementar intervenciones tempranas.

La caries dental se comprende actualmente como un continuo que va desde etapas subclínicas, luego a etapas clínicas con sutiles cambios en la superficie dentaria que son difíciles de pesquisar hasta lesiones evidentes, cavitaciones y finalmente la destrucción y pérdida del diente. Asimismo, dado que la caries resulta del desbalance del microbioma estimulado metabólicamente con azúcares, estas lesiones pueden encontrarse activas o inactivas, dependiendo de la actividad del biofilm (Kidd y Fejerskov, 2004). Así, las lesiones activas no cavitadas pueden remineralizarse por la acción de la saliva y la disminución de la producción de ácidos del biofilm (Figura 1.b). Sin embargo, la cavitación marca un hito irreversible en la lesión (Figura 1.c en adelante). Una vez que ocurre la cavitación no es posible remineralizar la superficie del diente. Los dientes que sufren la cavitación requieren tratamiento restaurador. Asimismo, el daño extenso por caries podría llevar a la pérdida del diente.

El estudio de la prevalencia de caries incluye no solo la presencia o ausencia de lesiones, ya sea a nivel de lesión no cavitada o cavitada,

sino que además la severidad de la caries. Así, la etapa en la que la lesión de caries se mida afecta de manera importante la evaluación epidemiológica. Una evaluación enfocada en lesiones cavitadas entrega información de utilidad para identificar superficies que requieren de tratamiento restaurador, mientras que una evaluación que incluya lesiones no cavitadas entregaría información que permitiría identificar aquellos pacientes que se beneficiarían de intervenciones no invasivas, como la aplicación de fluoruros, refuerzo de higiene oral y consejería dietética.

1.3.4.1 Criterio diagnóstico tradicional de medición de caries

El criterio tradicional de la OMS para el diagnóstico de caries indica que se debe consignar como caries solo aquellas lesiones cavitadas (OMS, 1997). Esta cavidad debe ser suficiente como para que quepa la punta de una sonda exploradora dental. Excluye las lesiones no cavitadas debido a que no se pueden diagnosticar de modo fiable. Este es el criterio más utilizado en los estudios epidemiológicos de caries (Bader et al., 2001).

1.3.4.2 Criterios que incluyen la presencia de lesiones no cavitadas

Para identificar aquellos individuos que se beneficiarían de intervenciones preventivas para la caries dental es necesario utilizar un criterio diagnóstico que incluya aquellas lesiones no cavitadas (Figura 1.b). El problema es que estas lesiones son difíciles de identificar, por lo que pocos estudios epidemiológicos las incluyen. Solo recientemente se

han validado criterios diagnósticos que permiten identificar de manera confiable las lesiones no cavitadas en la dentición temporal (Parisotto et al., 2012). El procedimiento incluye la remoción del biofilm de la superficie del diente, el secado y la iluminación óptima (≥ 120 lumen).

1.3.4.3 Criterios que incluyen la actividad de lesiones

La lesión de caries representa un proceso altamente dinámico dirigido por la actividad del biofilm estimulado con carbohidratos fermentables. Por esto, identificar la actividad de la lesión es una medida fiable de la actividad del biofilm: una lesión activa representa un biofilm activo (Nyvad y Fejerskov, 1986).

Si bien la OMS recomienda abstenerse de registrar la actividad, indicando que es un valor poco fiable (OMS, 1997), en 1999 Nyvad et al. validaron un sistema que permite identificar lesiones activas e inactivas (Nyvad et al., 1999). Los criterios de Nyvad han sido a su vez validados para la dentición temporal, mostrando valores de acuerdo diagnóstico kappa interexaminador de 0.82 e interexaminador de 0.82 (Séllos y Soviero, 2011).

Si bien existen otros criterios, como los International Caries Detection y Assessment System (ICDAS). Estos muestran diferencias significativas de acuerdo intra e inter examinador para la categoría diagnóstica que identifica la actividad de la lesión (Assaf et al., 2006).

1.3.4.4 Evaluación de la severidad de la caries

La severidad de la caries se mide sumando la cantidad de (d) dientes (c) cariados, (e) extraídos u (o) obturados por caries. Este corresponde al índice ceod. Cuando se utiliza en dientes permanentes se escribe en mayúsculas y reemplazando la e de extraído por P de perdido, quedando como COPD. Así, un niño con un diente con caries, dos obturados y ninguno perdido tendría un ceod = 3.

El componente caries puede registrarse en tres niveles: como lesión no cavitada (c_1), como cavitación de esmalte (c_2) o como cavitación de dentina (c_3). Usualmente se utiliza c_3 para cualquier tipo de cavitación. Así, un niño que tenga dos lesiones no cavitadas, tres cavitadas y un diente obturado tendría un índice ($c_1=2 + c_2=3 + o=1$) = $c_1c_3eod = 4$. Un resumen de las definiciones y relevancia clínica se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Índice ceod de severidad de caries en dientes temporales.

Índice	Definición	Relevancia clínica
c1	Diente con lesión de caries no cavitada	Susceptible de revertir mediante higiene, control de dieta y fluoruros
c3	Diente con lesión de caries cavitada	No es susceptible de revertir.
e	Diente extraído por caries	Pérdida completa del diente. Asociado a maloclusión en dentición definitiva por la pérdida de espacio en dentición temporal (Finucane, 2012).
o	Diente obturado por caries	El 50% de las restauraciones en niños con CTI fracasan debido a caries (Mjör et al., 2002).
ceo	Suma de los dientes c, e y o	Puede ser por diente (ceod) o superficie (ceos). En esta investigación se utilizará por diente.
c1c3eod		Incluye lesiones no cavitadas
c3eo		Excluye lesiones no cavitadas. Corresponde al criterio tradicional de la OMS (OMS, 1997)

El hecho que la mayoría de los estudios reporten solo c_3 sugiere éstos tienden a subestimar la prevalencia de CTI

Este es el índice más utilizado debido a que es simple, replicable, versátil y estadísticamente fácil de manejar. Sin embargo tiene desventajas:

- Es un índice acumulativo. Así, un individuo que presenta una lesión cavitada continúa siendo contado como “enfermo” por el resto de su vida.
- Da la misma importancia a un diente con una caries que a un diente perdido por caries.
- Dos poblaciones pueden tener el mismo índice, por ejemplo $ceod=10$, y representar varias situaciones muy distintas. Por ejemplo una comunidad podría tener sólo niños con dientes con caries, lo que suma diez. Otra comunidad podría tener niños que han perdido en promedio diez dientes. Ambas comunidades aparecerán con el mismo $ceod$.
- Mide la historia o experiencia de caries por lo que no entrega información acerca del estado actual del paciente. Esto puede tener repercusiones a la hora de tratar de identificar factores de riesgo, pues se establecería asociación entre un factor de riesgo actual con la historia o experiencia de caries y no con la actividad actual de la caries.
- Es un índice de enfermedad más que de salud (Espinoza et al., 2012)

1.3.5 Criterios utilizados para la caries temprana de la infancia

Dye et al. (2015) mediante una revisión de la literatura identificó 87 artículos de prevalencia de caries entre 1988 al 2012. El 38% de los estudios utilizó el criterio OMS, seguido del 15% que utilizó solo

diagnóstico visual. Asimismo, sólo 15% de los estudios incluyeron el registro de lesiones no cavitadas (c_1) (Dye et al., 2015).

Asimismo, existen distintos criterios para evaluar los dientes. El diez por ciento de los estudios examinó solo dientes anteriores.

En resumen, la caries se puede medir en una población indicando su prevalencia, esto es la proporción de individuos con caries y su severidad, lo cual determina la cantidad promedio de dientes afectados por caries. De esta manera, por ejemplo, pueden haber dos poblaciones con la misma prevalencia, pero distinta severidad. Adicionalmente se puede registrar la actividad. Sin embargo, al medir solamente las etapas tardías de la lesión de caries, esto es, solo aquellas lesiones cavitadas, tendrían el efecto de subestimar la prevalencia real de la caries en la población, y limitaría el uso de esta información para identificar aquellos individuos que se beneficiarían de un tratamiento restaurador. El incluir las lesiones no cavitadas, por otra parte, permitiría identificar los individuos que se beneficiarían de intervenciones preventivas o no invasivas. Sin embargo tendría el efecto de aumentar la prevalencia.

1.3.6 Estudios de prevalencia de la caries temprana de la infancia

1.3.6.1 Estudios internacionales de prevalencia de CTI

Los estudios disponibles reportan una prevalencia de CTI desde 6.3% hasta 85% de los niños entre 1 a 5 años con un estimado del 50% (Uribe y Maldupa, 2014). El detalle se puede observar en la Tabla 3.

Tabla 3. Prevalencia y criterios diagnósticos de CTI reportada en estudios internacionales.

Autor	Año	País	Criterio	Prevalencia en %	n
Thitasomakul et al.	2001	Tailandia	OMS	68	599
Santos y Soviero	2002	Brasil	Otros	41.6	224
Wenhall et al.	2002	Suecia	OMS	85	238
Jin et al.	2003	Corea	OMS	56.5	430
Ramezani et al.	2003	Iran	OMS solo incisivos	19.5	544
Schrot et al.	2005	Canadá	OMS	53.7	408
Hallet y Rourke	2006	Australia	OMS	33.7	3515
Robcke	2008	Alemania	OMS solo incisivos	20.3	434
Nunn et al.	2009	EEUU	OMS solo incisivos	6.3	787
Priyadarshini et al.	2011	India	OMS	37.3	566
Chu et al.	2012	Hong Kong	OMS	51	700
En población aborígen					
Dogar et al.	2011	Australia	OMS	40	253
Kelly y Bruerd	1987	EEUU	OMS	50.3	514
Broderick et al.	1989	EEUU	OMS	63.5	1607
Barnes et al.	1992	EEUU	OMS	35.1	151

Las diferencias entre prevalencias se explicarían porque los individuos revisados corresponden a distintos subgrupos poblacionales. Por ejemplo el estudio de Wenhall et al (2002) en Suecia se hizo en niños de 3 años del estrato socioeconómico bajo y la severidad de caries reportada fue de 4.4. También existen distintos criterios diagnósticos, como el uso de solo los dientes anterosuperiores versus toda la boca.

Milnes en una revisión de la literatura de 1996, indica que los estudios de prevalencia en Africa (Sudáfrica, Nigeria, Tanzania y Sudan) reportan valores menores, del 5.5% a 37.4% en comparación a Norteamérica, con valores desde 5.3 a 72%. Por ello, sugiere que además de investigar la prevalencia de CTI es crucial identificar aquellos grupos de niños que por alguna razón están en mayor riesgo de CTI (Milnes, 1996)

Kassebaum et al reportan en una revisión sistemática la síntesis de 192 reportes de prevalencia de caries en dientes temporales realizados en 1502260 niños de 1 a 14 años en 74 países (Kassebaum et al., 2015), encontrando que la caries en dientes temporales no tratada afectaba al 9% de la población mundial.

1.3.6.2 Estudios de prevalencia de CTI en poblaciones de pueblos originarios

Los estudios epidemiológicos de CTI revelan además una distribución desigual, con la mayor prevalencia de caries en el grupo socioeconómico bajo o en pueblos originarios. Kelly y Bruerd investigaron la presencia de CTI en niños indígenas de Alaska y

norteamérica. Reclutaron 514 niños entre 3-5 años, 232 de Alaska y 282 nativos americanos encontrando una prevalencia de 66.8% y 41.8% respectivamente (Kelly y Bruerd, 1987). Estos resultados fueron similares a los de Broderick et al., quienes en 1987 reportaron una prevalencia de 72% en niños Navajos y 55% Cherokee (Broderick et al., 1989). Barnes et al., reportaron en 1230 niños una prevalencia de CTI de 22.2% para niños blancos americanos; 20.5% para afroamericanos; 23.8% para hispano-americanos y 35.1% para nativos (Barnes et al., 1992). Los autores explican esta mayor prevalencia de CTI en nativos como producto de una mezcla de pobreza, acceso limitado a servicios de salud y disponibilidad barata de alimentos ricos en azúcar. Todos estos estudios comparten el diseño de corte transversal y se limitan a lesiones cavitadas, siguiendo el criterio tradicional de la OMS

1.3.6.3 Estudios de prevalencia de CTI en Chile

En Chile existen a la fecha siete estudios que reportan la CTI. Comienzan en 1995 con el estudio de Mariño y Onetto de la Universidad de Valparaíso, quienes reportan una prevalencia en 151 niños de una zona rural (Canela) y otra urbana (Valparaíso). Utilizan el criterio OMS en niños de 3 años, encontrando valores de 62.3% de CTI para la zona rural y 41.5% para la zona urbana. La severidad fue de 2.77 vs. 1.71 ceod. Luego, Echeverría et al. (2003), en jardines infantiles de Santiago (n=169) utilizando el criterio OMS sólo en incisivos reportan una prevalencia de 33.7% en niños de 2 a 4 años. El

2007 un estudio del MINSAL encontró un resultado similar en Santiago (n=200) con una prevalencia a los 2 años de 27% y a los 4 años del 48%. Esto representa un aumento de casi el doble en dos años. La severidad reportada fue de 2.33 ceod.

Tres estudios en el sur de Chile muestran valores más elevados que los de Santiago. Zaror et al. reportan basados en una muestra por conveniencia de pacientes consecutivos que acuden al Hospital de Calbuco, una frecuencia de 53% a los 2 años y 88% a los 4 años (Zaror Sánchez et al., 2011). Este es el único estudio disponible donde se consideran las caries no cavitadas. Sugiere que la ruralidad actúa como factor de riesgo. En Valdivia, el año 2012 Nauto et al. realizaron un estudio poblacional en 394 niños examinados con el criterio de la OMS. Encontraron una prevalencia de CTI en niños de 2 a 5 años, encontrando una prevalencia de 50.8%. Los niños que iban a colegios públicos tenían una prevalencia de 52.3% y una severidad ceod=3.43 mientras que los de colegios privados la fue de 29.4% y ceod=0.41.

Un reciente reporte con datos del 2010 realizado por Hoffmeister et al., investigaron la prevalencia de CTI en 2987 niños de 2 y 4 años de las regiones de Bio-Bio, Araucanía, Los Lagos-Los Ríos y Aysén-Magallanes. Encontraron una prevalencia a los 2 años de 20.3% y 52.7% a los 4 años (Hoffmeister et al., 2016). El resumen de los estudios en Chile se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4. Estudios de prevalencia de CTI en Chile.

Autor/es	Año	Localidad	N	Muestra	Criterio	Características	Prevalencia (%)	Severidad
Marino y Onetto	1995	Valparaíso y Canela	151	Poblacional Urbano y rural	OMS	3 años Valparaíso Canela	41.5 62.3	copd 1.71 copd 2.77
Echeverría et al.	2003	Santiago	169	Poblacional	OMS solo incisivos	2 a 4 años	33.7	
MINSAL et al.,	2007	Santiago	200	Poblacional	OMS solo incisivos	2 años 4 años	27.0 48.0	0.54 (solo c) 2.33 c 2.07 o 0.23 e 0.03
Zaror Sánchez et al.	2011	Calbuco	301	Conveniencia Hospital Rural	OMS + c1	2 años 4 años	53.0 88.0	
Nauto et al.	2012	Valdivia	394	Poblacional Urbano	AAPD	2 años 3 años 4 años 5 años	38.9 51.8 52.1 54.1	1.13 1.84 2.07 2.28
Hoffmeister et al.,	2016	Regiones de Bío-Bío a Magallanes	2987	Poblacional	OMS	2 años 4 años	20.3 52.7	

1.3.7 Estado histórico de caries en América Latina

Los primeros reportes de salud bucodental de mapuches utilizaban material antropológico, y mostraban que la mayoría de los adultos tenía casi todos sus dientes así como una baja prevalencia de caries (Rusconi, 1938). Dos estudios comparativos con la población europea de su misma época, mostraron que los mapuches tenían mejor salud bucodental (Devoto et al., 1966, 1968) con una prevalencia de 59% de caries en comparación al 100% de caries en población de origen europeo (Devoto et al., 1968). Para la dentición temporal, la prevalencia de caries fue de 3% para la población mapuche y 69% para la población de origen europea (Devoto et al., 1968). Asimismo, la severidad promedio(desviación estándar) del daño de caries fue de 1.1(0.02) para los mapuches y 10.88(1.98) para los caucásicos. Esta evidencia antropológica muestra que la población mapuche gozaba de buena salud bucodental hasta antes de la llegada de los conquistadores europeos. Los autores explican que se podría haber debido a diferencias en la dieta del mapuche y del europeo. Esta afirmación es apoyada por estudios epidemiológicos que muestra el efecto del cambio en la dieta en poblaciones aborígenes de América. Así, el reporte de los efectos de la introducción de una dieta moderna con azúcar y carbohidratos refinados en una población nativa de la isla de Tristan de Cunha, permitió evaluar el impacto en la salud bucodental de la población nativa. Luego de una erupción volcánica, los habitantes de la

isla fueron evacuados a Inglaterra. El consumo de azúcar pasó de 1.8g/día/persona en 1938 a 150g/día/persona en 1966 mientras que el porcentaje de dientes con caries, obturados o perdidos por caries aumentó de 4% a 45% en los niños entre 1 a 5 años (Holloway et al., 1962).

En Chile, la principal etnia de pueblo originario es el pueblo mapuche (INE et al., 2005). Los estudios de salud oral disponibles muestran que a los 6 y 12 años la prevalencia de caries alcanza el 99% con una severidad COPD=2.82 (Vargas Sanhueza et al., 2015). Esta severidad luego aumenta a COPD=17.15 entre los 14 a 30 años (de la Maza y Cueto, 1989). Entre los 25 a 80%, todos los adultos mapuches del sector de Isla Huapi tenían caries, con una severidad COPD=14.59. El 12.5% de los adultos mapuches habían perdido todos sus dientes y el 71.4% tenían caries sin tratar. (Angel et al., 2010) Sin embargo no hay estudios que identifiquen la prevalencia de caries en población mapuche menor de 6 años, y este es uno de los objetivos del presente estudio.

1.3.8 Consecuencias de la caries temprana de la infancia

La caries en la dentición temporal afecta a 621 millones de niños en el mundo (Kassebaum et al., 2015) y es la cuarta enfermedad crónica de más caro tratamiento (Petersen, 2008). Solo en EEUU el tratamiento de caries requirió durante el 2014 el gasto de \$122 billones de dólares. La caries dental infantil no tratada puede causar dolor severo e infección

oral (Selwitz et al., 2007) lo que afecta la asistencia del menor al colegio así como la productividad de sus padres en el trabajo (Petersen et al., 2005).

Los niños con CTI tienen más hospitalizaciones que los niños libres de caries (Ladrillo et al., 2006), tienen alteraciones del desarrollo (Núñez et al., 2015), obesidad (Zaror S et al., 2014), menor calidad de vida, tanto los niños como sus padres (Acharya y Tandon, 2011). La infección oral por CTI se asocia a flegmones maxilofaciales. Los niños con caries en sus dientes temporales tienen 14 dientes más afectados por caries en comparación a niños que tuvieron sus dientes temporales sanos (Ekbäck et al., 2012). Las consecuencias de la caries temprana de la infancia acompañan a la persona por toda la vida (AAPD, 2008). Por esto, se requiere intervenir no sólo reponiendo los tejidos dentarios dañados por caries sino que también disminuyendo la probabilidad del inicio y progresión de lesiones de caries. Esto se hace más urgente considerando que los niños que nacen durante el 2016 podría llegar a vivir más de 100 años (Leeson, 2014).

1.3.9 Costos asociados al tratamiento de la caries temprana de la infancia

Los costos de la CTI tanto para el individuo como para la sociedad son enormes, particularmente para las minorías étnicas. El tratamiento de la CTI requiere la restauración de las superficies dentarias dañadas y en muchos casos la extracción de los dientes afectados para prevenir la

propagación de la infección maxilofacial. El costo estimado² de estos tratamientos en promedio bordea los USD1400 por niño (Bruerd y Jones, 1996): a este costo hay que sumar la sedación o anestesia (Schroth y Smith, 2007) , pues es muy difícil obtener la cooperación de niños menores de 4 años para estos tratamientos. Los costos adicionales van desde USD1400 (Kelly y Bruerd, 1987) hasta USD8700 (Duperon, 1995). Esto sin contar el costo social asociado, donde uno o ambos padres deben acompañar al menor durante su tratamiento. En el caso de aquellos niños que viven en zonas rurales el costo aumenta al incluir el transporte al centro urbano. Los niños tratados usualmente requieren re-tratamiento debido a nuevas lesiones de caries (Foster et al., 2006). El tradicional tratamiento restaurador de los niños con caries temprana de la infancia está fuera del alcance de la mayoría de las familias de países de ingreso medio o bajo (Yee y Sheiham, 2002). Cabe mencionar que no existe evidencia de efectividad del enfoque restaurador para la caries temprana de la infancia (Twetman y Dhar, 2015). Por esto, la CTI no puede ser resuelta con el actual enfoque curativo, lo que hace urgente identificar estrategias alternativas para su control y prevención.

1.3.10 Resumen sobre la prevalencia de CTI

La prevalencia de CTI es un mal endémico, con una prevalencia que va desde 1 a 32% en los países desarrollados (Douglass et al., 2001; Urzua

²ajustado al valor del dolar 2015

et al., 2012) hasta el 90% en los países en desarrollo y subdesarrollados (Vadiakas, 2008). La severidad va desde 0.74 hasta 12 dientes con caries, obturados o extraídos por caries (ceod) por niño (Vadiakas, 2008). La CTI presenta una distribución asimétrica en la sociedad, con la mayor prevalencia y severidad concentrada en los niños más pobres, de minorías étnicas, inmigrantes, de zonas rurales o de pueblos originarios. El método tradicional de diagnóstico tiene como umbral de detección la lesión de caries cavitada, donde ya no es posible intervenir de manera preventiva sino sólo mediante procedimientos restauradores caros e inefectivos. El daño, dolor e infección producto de la CTI deteriora la calidad de vida de los niños y sus familias y sus consecuencias, como las alteraciones del desarrollo, nutricionales y mayor riesgo de caries en dentición temporal, se mantienen por toda la vida del individuo. La resolución de la CTI es de alta complejidad y tiene asociados altos costos económicos, tanto para el individuo como para la sociedad. Todo esto convierte a la CTI en el principal problema de salud pública en odontología.

Un estudio que entregue información acerca de la prevalencia y que además permita identificar la proporción de la población con lesiones susceptibles de ser detenidas y revertidas sería de utilidad para la identificar poblaciones que se beneficiarían de intervenciones no invasivas. Sin embargo no existe un estudio de la prevalencia de CTI que abarque población tanto rural como urbana y que incluya explícitamente a población de pueblos originarios. Los estudios

realizados en Chile abarcan muestras urbanas (Echeverría et al., 2003; Hoffmeister et al., 2016; MINSAL et al., 2009, 2007; Nauto et al., 2012) o por conveniencia de hospitales o consultorios (Zaror Sánchez et al., 2011) y aquellos que incluyen población rural (Giacaman et al., 2015) o de pueblos originarios (Ángel et al., 2010; de la Maza y Cueto, 1989; Vargas y Herrera, 2002; Veliz, 1997) no incluyen a preescolares.

1.4 Factores de riesgo en el desarrollo de la caries temprana de la infancia

Una vez que la lesión de caries del diente temporal se ha cavitado, el diente requiere ser restaurado. Sin embargo, las intervenciones restauradoras han demostrado ser inefectivas para el tratamiento de la CTI con una alta tasa de recurrencia de lesiones y fracaso de las restauraciones (Twetman y Dhar, 2015). Por otra parte, existe evidencia donde se muestra que es posible disminuir la prevalencia de caries en la población infantil mediante la identificación de factores de riesgo específicos y la posterior implementación de un programa preventivo enfocado en el control de los factores de riesgo particulares. Es así como en Chile, Gómez et al., mostraron que los niños sometidos a un programa preventivo que comenzaba en la madre embarazada focalizado en factores de riesgo específicos para una población cautiva de familias de la Armada era efectivo en disminuir la incidencia y prevalencia de caries en la dentición temporal, y que estos efectos se mantenían incluso luego de haber detenido el programa preventivo (Gómez et al., 2007, 2001; Gómez y Weber, 2001). Por esto, el conocimiento de los factores de riesgo de la CTI permitiría por un lado comprender su etiología y por otro identificar objetivos de intervenciones preventivas para disminuir su prevalencia y severidad contribuyendo así a disminuir esta desigualdad en salud.

El estudio de los factores de riesgo permitiría generar un marco conceptual aportando información de dos de las cuatro dimensiones

necesarias para el estudio de la equidad en salud, a saber, I) el estado de salud, II) sus determinantes sociales, III) recursos y oferta del sistema de salud y IV) utilización de estos servicios (Arteaga et al., 2002). Esta investigación se enfocará en el estado de salud y sus determinantes sociales y dejará fuera los aspectos III y IV.

En este capítulo se expondrán los factores de riesgo reportados en la literatura para la caries temprana de la infancia.

1.4.1 Definición de riesgo y factor de riesgo

El riesgo es la probabilidad que algo ocurra. En epidemiología, se refiere a la probabilidad que un evento ocurra luego de la exposición a un factor (Burt, 2005) . Este factor de riesgo es un factor ambiental, conductual o biológico confirmado mediante una secuencia temporal que, de estar presente, aumenta la probabilidad de enfermar y, que de estar ausente o ser removido, disminuye esa probabilidad (Beck, 2007). En rigor, un indicador de riesgo debe cumplir con tres requisitos para ser considerado como tal: (1) debe estar asociado estadísticamente a la enfermedad, (2) debe estar asociado de manera temporal a la enfermedad y (3) la asociación observada debe descartar de manera razonable la existencia de error mediante un diseño apropiado y un constructo epidemiológico basado en la evidencia disponible (Kleinbaum et al., 1982). Aquellos factores de riesgo sin evidencia de secuencia temporal (criterio 2 de Kleinbaum) se les denomina indicadores de riesgo (Beck, 2007). Aquí se utilizará de manera

indistinta el término factor de riesgo e indicador de riesgo, dado que en la literatura es común encontrar factores de riesgo reportados en diseños de corte transversal y retrospectivos.

1.4.2 Factores de riesgo de la CTI

La etiología de la CTI es compleja, y recientes revisiones sistemáticas han identificado factores de riesgo reportados en la literatura. Estos factores han sido a su vez integrados en marcos de trabajo conceptuales que sostienen el rol de los determinantes sociales en la CTI.

Para comprender estos modelos podemos comenzar con el marco de trabajo entregado por la OMS que indica que el salario, educación, ocupación, clase social, género y raza o etnicidad son los determinantes sociales estructurales de las inequidades sanitarias, las que resultan posteriormente de los mecanismos políticos, sociales y económicos en el contexto de un país en particular (Solar, 2010). Esto explica el hecho que los niños de familias más deprivadas concentren la mayor carga de CTI, tanto en países subdesarrollados como en países desarrollados.

Este marco conceptual permite generar modelos de riesgo, que son aquellos que permiten identificar aquellos factores de riesgo susceptibles de ser alterados mediante intervenciones (Beck, 2007).

1.4.2.1 Modelos que explican la CTI

Existen tres modelos que recogen la evidencia disponible y la organizan para tratar de explicar la etiología de la CTI.

1.4.2.1.1 Modelo multinivel de Fisher-Owens, 2007 (Fisher-Owens et al., 2007)

El modelo de Fisher y Owens (Fisher-Owens et al., 2007) identifica de manera conceptual, mediante un modelo multinivel, los distintos factores que influyen la salud bucal del niño. Traslada el foco de atención desde los factores biológicos hacia cinco grandes dominios a saber: (1) factores genéticos y biológicos, como el biofilm y salud de los padres; (2) ambiente social, que incluye el nivel socioeconómico, conductas y actitudes de salud familiares; (3) el ambiente físico, que incluye la urbanización, acceso a agua potable; (4) las conductas que influyen el estado de salud, particularmente aquellas compartidas por la comunidad y que incluye las creencias propias de los pueblos originarios, y (5) el cuidado médico y dental, que abarca en acceso a la atención sanitaria y seguros.

1.4.2.1.2 Modelos social-materno de Seow, 2012

Por su parte, el modelo de Kim Seow (Kim Seow, 2012) provee un marco de trabajo que conecta conceptualmente los factores mediadores social, psicológicos y conductuales involucrados en la CTI. Enfatiza el rol de tres elementos: (1) el ambiente social, (2) la madre, su nivel de educación, económico y social, y (3) factores individuales del niño que incluyen alteraciones en la formación de los dientes que los harían más susceptibles a la caries.

En relación a la CTI, el modelo de Seow propone que el riesgo de una mala salud se puede perpetuar de una generación a otra. Así, una

madre de bajo nivel socioeconómico tiene más riesgo de tener problemas de salud durante el embarazo, lo que se asocia a parto prematuro o bajo peso al nacer, ligado a su vez a malnutrición infantil, lo que lleva a alteraciones en la formación del esmalte dental que hacen más probable el inicio y progresión de una lesión de caries. Adicionalmente, al nivel socioeconómico, las poblaciones de inmigrantes, étnicas e indígenas comparten elementos como un acceso limitado al sistema de salud que los pone en mayor riesgo desarrollar CTI. A éstos, Seow añade el rol del nivel educacional de la madre, sus creencias de salud, estilo de vida y locus de control, por lo que la CTI se podría explicar en gran medida por un cuidado familiar disfuncional.

Lo que comparten los modelos de Fisher-Owens y Seow es que trasladan el foco de los determinantes biológicos, como el biofilm, hacia determinantes sociales, como la educación de la madre y el rol mediador de la pobreza en la etnicidad y ruralidad. De tal manera que, mientras el modelo de Fisher et al., (2012) se enfoca al lado de los aspectos ambientales y socio-económicos, el modelo de Seow se enfoca en aquellos maternos (Seow, 2012).

Sin embargo, el estudio de factores de riesgo poblacionales tiene la limitación que el riesgo no es transferible a los individuos y no puede ser pronosticado. Más bien, el riesgo puede ser estimado para una población o subgrupo (Divaris, 2015) por lo que su uso clínico es limitado, pero adquiere relevancia en la toma de decisiones a nivel de salud comunitaria.

1.4.2.1.3 Modelo de disparidades sociales, de Lee y Divaris, 2013

Lee y Divaris (2013), integran en su modelo de las influencias multinivel de Fisher-Owens et al., del 2007 junto al enfoque del factor de riesgo común de (Watt y Sheiham, 2012). Este enfoque de riesgo común sugiere que existen factores de riesgo compartidos por las enfermedades crónicas no transmisibles. Así, los determinantes estructurales, como las políticas macroeconómicas, sociales y todo el contexto económico y político del países, que incluyendo la globalización, influyen sobre los determinantes intermedios, que son las circunstancias y riesgos para la salud oral, como la posición socioeconómica de las personas (clase social, etnia, trabajo e ingresos). Estos a su vez influyen sobre las circunstancias materiales (condiciones de vivienda y trabajo), de conducta, psicosocial y de servicios de salud, los que explican las desigualdades en salud y el gradiente social de las enfermedades crónicas orales, las que son compartidas con otras patologías crónicas.

Estos son los tres grandes modelos que a la fecha explican la CTI, su distribución en la población y factores de riesgo asociados.

A continuación, se examinará la evidencia disponible para los factores de riesgo específicos de la CTI, agrupándolos en demográficos, biológicos y sociales. Si bien existen innumerables factores de riesgo reportados en más de 150 estudios en PubMed, sólo se considerarán aquellos que cumplan con alguno de estos requisitos: (1) haber sido reportados en una revisión sistemática de factores de riesgo de CTI; (2)

que tengan una medida cuantitativa de riesgo, ya sea riesgo relativo (RR), razón de prevalencia (RP) u odds ratio (OR) y (3), haber sido reportado en un estudio realizado en Chile. Todos estos factores de riesgo buscan explicar la historia de caries, esto es, la presencia de caries cavitadas, obturaciones o dientes perdidos por caries en niños preescolares. No hay a la fecha estudio sobre los factores de riesgo de la actividad de caries, vale decir, la presencia actual de caries en dentición temporal.

1.4.2.2 Factores de riesgo demográficos

1.4.2.2.1 Edad

La edad afecta la CTI dado que el índice que mide la caries (ceod), es acumulativo. Por esto siempre un niño de más edad tendrá más riesgo de caries. por lo que se utiliza como una variable de control (Barnes et al., 1992).

1.4.2.2.2 Sexo

El hecho que los dientes erupcionaran antes en niñas y que estos dientes sufrieran de caries antes que los dientes de los niños hacía que se asociara erróneamente el sexo femenino un mayor riesgo de CTI (Dolado et al., 1996). Sin embargo al controlarlos por edad se observa que no hay diferencias de riesgo por sexo (Martinez-Mier y Zandona, 2013)

1.4.2.2.3 Zona o región geográfica

Hoffmeister et al. (2016) reportaron diferencias en las razones de prevalencia de CTI entre niños de las regiones de Biobío a Magallanes, con el mayor riesgo para aquellos del Biobío (RP=1.65 IC 1.1-2.47). Las autoras explican que se asociaría al bajo nivel de fluoruros en el agua potable de esa región (0.003 a 0.055 ppm (partes por millón)).

1.4.2.3 Factores de riesgo biológicos

1.4.2.3.1 Placa dental (Biofilm dental)

Warren et al. 2008 en un estudio longitudinal de un año encontraron que los niños con biofilm visible en sus dientes tenían mayor prevalencia de CTI (Warren et al., 2008). Ellos recolectaron muestras del dorso lingual y lograron identificar *Streptococcus mutans* y *Streptococcus sobrinus* entre las especies que estaban en mayor proporción en los niños con CTI. Sin embargo existe controversia acerca de la fiabilidad del método para detectar la presencia de biofilm dental (Hefti y Preshaw, 2012). El método más utilizado sigue siendo el Índice de Placa Visible, que recolecta mediante un trozo de algodón el biofilm de la superficie vestibular de los dientes (Yoon et al., 2012). Por otra parte, recientes investigaciones del microbioma oral han propuesto que en los sujetos con caries ocurre un cambio relativo de la cantidad de especies (Hajishengallis et al., 2015), sin que se detecten pacientes libres de *Streptococcus mutans* o *Streptococcus sobrinus*, ya sea que tengan caries o no (Wolff et al., 2013). Esto sugiere que no es la

presencia de biofilm dental per se lo importante sino de un determinado tipo de bacterias en él lo que se asocia a la historia de caries. Y a su vez, el principal factor que altera la composición del microbioma oral ha demostrado ser el consumo de azúcares extrínsecos no lácteos (Nyvad et al., 2013).

1.4.2.3.2 Cepillado

El cepillado actúa como factor protector de la CTI cuando se asocia al uso de pasta dental fluorada (Slabsinskiene et al., 2010). Al ajustar por nivel socioeconómico, la ausencia de cepillado aparece como factor de riesgo sólo en niños del nivel socioeconómico bajo (Davies et al., 2007). El cepillado es un factor que depende de la declaración de los padres del menor, por lo que tiene un alto riesgo de sesgo de aprobación social, esto es, declarar algo que es socialmente deseable en vez de lo que realmente hace el individuo. Otra manera de investigar el rol del cepillado es preguntar a los padres por sus propias conductas de cepillado, encontrando una asociación protectora entre aquellos apoderados que declaran cepillarse los dientes al menos dos veces al día y el hecho que sus hijos tengan menos CTI (Hsieh et al., 2012). Sin embargo al ajustar por pobreza, el cepillado desaparece como factor protector (Gibson y Williams, 1999). El hecho que el ajuste por pobreza tenga este efecto sugiere que, o los padres de los niños pobres tiene un mayor sesgo de aprobación social o que existen otros factores asociados a la pobreza que interactúan entre el cepillado y la CTI. Por otra parte,

un estudio clínico controlado en 450 niños encontró que el proveer de instrucción de higiene oral a los padres es insuficiente para prevenir la CTI en sus hijos (Jiang et al., 2014). Además, Peretz y Gluck en un estudio clínico de 30 pacientes y un año de duración encontró que un programa preventivo de higiene oral fue efectivo pero sólo en aquellos pacientes que además disminuyeron su consumo de azúcar (Peretz y Gluck, 2006). En Chile, Hoffmeister et al. encontraron mayor riesgo (RP = 1.37 IC95% [1.18, 1.60] en los niños de 4 años cuyos padres declararon que les lavan los dientes una vez al día o menos (Hoffmeister et al., 2016). En la revisión sistemática efectuada por Harris et al., (2004) aparece como factor de riesgo la frecuencia igual o menor a un cepillado diario o que no sea supervisado por un adulto.

1.4.2.3.3 Fluoruros

La guía de recomendación de fluoruros en Chile restringía el uso de pastas dentales fluoradas en menores de dos años (MINSAL, 2009). Sin embargo, una revisión sistemática de la literatura encontró que la pasta dental fluorada con contenido de flúor igual o mayor a 1000 ppm actúa de manera efectiva disminuyendo la prevalencia de caries en preescolares (Uribe et al., 2014) con una fracción de prevención del 21% al 43%. Por otra parte, el uso de pastas dentales con 600 ppm o menos ha mostrado ser inefectivo para la prevención y control de la CTI (Uribe et al., 2014). Esta evidencia fue incorporada en la actual recomendación del MINSAL (MINSAL, 2013)

Al igual que el cepillado, el reporte por un familiar del uso de pasta dental fluorada en el menor tiene asociado un sesgo de deseabilidad social.

1.4.2.4 Factores de riesgo nutricionales

1.4.2.4.1 Consumo de azúcar

El consumo de azúcares extrínsecos no lácteos, que de ahora en adelante se denominará simplemente como azúcar, ha sido propuesto como el principal factor de riesgo de la caries (Sheiham y James, 2014; Peres et al., 2016). Cualquier factor que relacionado con el consumo de azúcar debería tener impacto en la caries, dado que el consumo de azúcares es el factor que inicia, promueve y mantiene la disbiosis del microbioma oral que provoca la desmineralización del diente (Nyvad et al., 2013). Si bien la OMS recomienda que el consumo de azúcares debería corresponder como máximo al 10% del total de la ingesta calórica, recientes investigaciones sugieren que el valor compatible con salud bucal está en el 5% (Moynihan, 2016; Moynihan y Kelly, 2014). La revisión sistemática de Burt del 2001 encontró que la relación entre consumo de azúcar y caries era directamente proporcional antes de la disponibilidad masiva de fluoruros, mientras que en la época actual esa correlación ha disminuido (Burt y Pai, 2001). Según Han et al. (2014), el consumo de azúcares, puede influir en la CTI ya sea que se ingiera en alimentos o en bebidas (RP=1.2 IC 95% [1.01, 1.60]). El factor de riesgo reportado con más frecuencia es el consumo de líquidos azucarados en

la mamadera antes de dormir, el que se tratará en forma separada más adelante.

1.4.2.4.2 Lactancia materna

La lactancia materna dentro de los períodos recomendados por la OMS, a saber, mínimo 6 meses y máximo 2 años, actúa como un factor protector contra la caries según dos revisiones sistemáticas de la evidencia disponible (Avila et al., 2015; Tham et al., 2015) con un OR de 0.43 (95% IC 0.23-0.80).

1.4.2.4.3 Uso de biberón y mamadera

Peressini mediante una revisión de la literatura encontró evidencia de pobre calidad y con resultados contradictorios. De 74 estudios encontrados, solo dos son de calidad moderada y muestran que el biberón no tiene efecto protector ni de riesgo, siempre que se utilice libre de cualquier endulzante como miel o azúcar (Peressini, 2003).

El uso de mamadera ha sido un factor de riesgo reportado de manera consistente en la literatura. De hecho, la caries temprana de la infancia se denominaba también como caries de la mamadera o del biberón (Drury et al., 1999). Extrapolando la información del biberón, la mamadera per se no es un factor de riesgo. Sólo cuando se utiliza con líquidos azucarados es que se torna un factor de riesgo significativo. Este riesgo puede aumentar a su vez si se utiliza la mamadera con líquidos azucarados antes de dormir o durante la noche. Dado que el flujo salival disminuye casi a cero, prácticamente no hay una

oportunidad para la remineralización, por lo que las lesiones aparecen en un período menor a 6 meses (Robke, 2008). El patrón característico de la caries temprana de la infancia que se observa en la Figura 2 muestra el rol protector que cumple el labio inferior sobre la superficie vestibular de los incisivos mandibulares. Por el contrario, los maxilares son rápidamente afectados. En el estudio de Hoffmeister et al., (2016) en Chile se reporta una $RP= 1.3$ (95%IC 1.06-1.59) para niños de 4 años, mientras que en los de 2 años una $RP=1.43$ (95%IC 0.97-2.10)

1.4.2.4.4 Consumo de bebidas y jugos

Es necesario diferenciar el consumo de líquidos con o sin azúcar. Mientras que el consumo de jugo natural no está asociado a la CTI (Vargas et al., 2014), el consumo de bebidas azucaradas se asocia a la CTI severa (AbdelAziz et al., 2015; Han et al., 2014). Hoffmeister et al. (2016), en Chile reportan en niños de 2 años $RP=1.14$ (IC95% [0.79, 1.63] y a los 4 años de 1.08 (IC95% [0.88, 1.32]. Estos resultados paradójicos se explicarían porque los jugos pueden ser naturales (con azúcares intrínsecos como la fructosa) o extrínsecos no lácteos (sacarosa), por lo que en el presente estudio se investigará este importante factor.

1.4.2.4.5 Presencia de huerta

Según Yen et al. (2010), el consumo de verduras está asociado a un menor riesgo de CTI ($OR=0.97$ IC 95%[0.94, 0.99]) (Yen et al., 2010) por lo que actuaría como un factor protector. y dado que la presente

investigación se realizará en una zona con alto índice de ruralidad, pareció interesante incluir la presencia de huerta. Se entiende como huerta un jardín que provee de frutas, verduras o cualquier vegetal para el consumo del grupo familiar. El consumo de verduras podría proteger de la caries dental debido a su contenido de fibra y polifenoles, que interferirían con la formación del biofilm dental y su producción de ácidos (Touger-Decker y van Loveren, 2003).

1.4.2.5 Determinantes sociales de la salud que afectan el desarrollo de caries

1.4.2.5.1 Etnicidad

Los estudios epidemiológicos muestran que la prevalencia varía entre distintos grupos étnicos o razas. La encuesta nacional de salud de EEUU NHANES III (Dye et al., 2007) muestra que la prevalencia de CTI entre niños del estrato socioeconómico alto fue de 26.5% para latinos, 23.3% para afroamericanos y 17.1% para blancos. En los estratos pobres fue de 50.2%, 37.4% y 41.7% respectivamente. Dos investigaciones disponibles que tenían por objetivo evaluar la raza o etnicidad como factor de riesgo de CTI encontraron una asociación positiva entre pertenecer a los nativo-americanos (OR=3.57 IC 95% [2.5, 5.09], afroamericano (1.41 IC 95% [1.02, 1.96]) y latino (1.87 IC 95% [1.53, 2.28] tomando a los blancos como referencia (Psoter et al., 2006). Por su parte, Shibosky, quienes encontraron resultados similares, concluyeron que los estudios de CIT deberían enfocarse en grupos étnicos específicos a objeto de identificar los factores de riesgo

que estarían actuando en ese grupo en particular (Shiboski et al., 2003).

Hoy, el concepto de etnia y raza está más asociado más a un constructo social que a una determinada constitución genética. Así, la manera de medir la raza y etnicidad es mediante la autodeclaración (Winker MA, 2004). Esto asegura que la designación se acerque lo más posible a lo que el individuo identifica como sus valores y creencias.

En Chile el 4.6% de la población declaró en el censo del 2002 pertenecer a una etnia y de éstas, el 87.3% lo representaron los mapuches (INE, 2002). En Chile viven preferentemente en zonas rurales. La raza y etnicidad son conceptos en evolución. Por ejemplo en Chile había antes zambos, criollos, mestizos y mulatos entre otros. Si bien se ha sugerido que se podrían distinguir por su linaje genético, en América no queda ningún linaje de los habitantes antes de la colonización europea (Llamas et al., 2016). A pesar de ser la mayor etnia en Chile, con aproximadamente 1,715,000 habitantes (Instituto Nacional de Estadística, 2013), la salud bucodental del pueblo mapuche es un tema poco estudiado. El primer estudio disponible en Chile acerca de la salud bucodental de los mapuches reportó los resultados del examen de 200 individuos mapuches entre 14 a 30 años a objeto de compararlos con una población que no reconocía pertenecer a la etnia mapuche (De la Maza y Cueto, 1989). Estos autores encontraron un índice COPD de 18.1, cifra que era significativamente mayor que el promedio nacional de un grupo etario similar de la época. Equivalentes

hallazgos fueron identificados posteriormente en una población escolar rural que incluía un porcentaje importante de población mapuche, como se mencionó previamente, (Vargas y Herrera, 2002). Los estudios internacionales encuentran que la etnicidad actúa como un factor de riesgo de CTI, pero no aclaran si actúa de manera directa, o es mediante la pobreza (Psoter et al., 2006), o el acceso limitado a la atención de salud (Darmawikarta et al., 2014). En Chile, no hay información publicada de la prevalencia de CTI en población mapuche ni estudios que lo investiguen como factor de riesgo.

1.4.2.5.2 Ruralidad

La definición de rural en Chile corresponde a áreas con menos de 2000 habitantes (INE, 2002). En 1995, Mariño y Onetto reportaron la prevalencia de CTI en niños de 3 años de una comunidad urbana (Valparaíso) y rural (Canela), encontrando diferencias significativas tanto en la prevalencia (41.5% vs. 62.3% respectivamente) y severidad (1.71 vs. 2.77 ceod respectivamente). Ellos lo asocian a la diferencia de exposición a agua potable fluorada, sin descartar que otros factores puedan estar explicando esta divergencia (Marino y Onetto, 1995). En China, una revisión de 102 artículos reporta una prevalencia mayor en zona rurales que urbanas (65.3% vs. 59.5%), pero esta diferencia aumenta al considerar la proporción de niños tratados: 1.6% en zona rural vs. 6.0% en urbana (Zhang et al., 2016).

1.4.2.5.3 Acceso a la atención sanitaria: odontológica y médica

Mariño y Onetto (1995) sugirieron que la mayor prevalencia en Canela, comunidad rural en Chile, era debido al menor acceso a la atención sanitaria. Dicho acceso podría actuar mediante la limitación de información sanitaria que les llega a las personas con acceso limitado, o como parte de una interacción entre pobreza, ruralidad o etnicidad (Ahn et al., 2011). Esto incluye tanto a la atención odontológica como a la atención médica

1.4.2.5.4 Sistema de salud como indicador de nivel socioeconómico en Chile

En Chile existen dos sistemas de salud. Los ciudadanos pueden elegir entre un Fondo Nacional de Salud (FONASA) que es público o una compañía privada de seguros de salud (ISAPRES) que tiene algunas restricciones. El 2008 el 68% de la población estaba en el sistema público y el 18% en el privado. El porcentaje restante estaba en otro tipo de seguros, como el de las Fuerzas Armadas, o declaraba no tener seguro (Bastías et al., 2008). Esta distribución se explica por los ingresos de las personas, con la mayoría de los ricos en el sistema privado. En odontología, existe una desigualdad con mayor utilización de los servicios dentales entre la población más rica y dentro del sistema privado (Vásquez et al., 2013). Esto sugiere que en Chile, el sistema de salud elegido sirve como un indicador del nivel socioeconómico. Considerando que la CTI muestra una fuerte desigualdad entre estratos socioeconómicos (Do et al., 2014; Dos

Santos Junior et al., 2014; Reisine y Psoter, 2001), se puede asumir que en Chile el sistema de salud o el uso del mismo es un indicador del nivel socioeconómico familiar (Cornejo-Ovalle et al., 2015).

1.4.2.5.5 Vivienda y acceso a urbanización básica: electricidad y agua potable.

El tipo de vivienda sirve como un indicador del nivel socioeconómico, junto con la ubicación residencial de la vivienda y permite explicar parte de la distribución desigual de la CTI en la población (Thomson y Mackay, 2004).

La falta de acceso a electricidad y agua potable, como parte de la urbanización, se ha descrito como un factor de riesgo para la CTI en preescolares de Taiwan (Tsai et al., 2006) y de México (Maupomé, 1998).

1.4.2.5.6 Resumen factores de riesgo de la CTI

Una tabla resumen de los factores de riesgo se muestra a continuación (Tabla 5).

Tabla 5. Resumen factores de riesgo de la CTI. Asociación + indica riesgo cuando está presente y - cuando está ausente

Factor de riesgo	Asociación	¿Reportado en Chile?	Referencias
Placa o biofilm dental	+		(Chaffee et al., 2013; Hague, 2011; Fierro Monti et al., 2014)
Cepillado	-	Si	(Hsieh et al., 2012; Hoffmeister et al., 2016)
Uso de pasta dental fluorurada	-		(Schwarz et al., 1998; Uribe et al., 2014)
Uso de mamadera diurna con azúcar	+		(Barnes et al., 1992; Bruerd y Jones, 1996)
Uso de mamadera nocturna con azúcar	+	Si	(Barnes et al., 1992; Bruerd y Jones, 1996; Hoffmeister et al., 2016)
Consumo jugos naturales sin azúcar	-		(AbdelAziz et al., 2015; Vargas et al., 2014)
Consumo de bebidas carbonatadas con azúcar	+		(Han et al., 2014)
Control odontológico	-		(Han et al., 2014)
Control médico	-		(Mouradian et al., 2000)
Presencia de huerta en casa	?		(Touger-Decker y van Loveren, 2003)
Pertenecer a pueblo originario	+		(Fisher-Owens et al., 2012; Kim et al., 2012; Psoter et al., 2006)
Vive en zona rural	+	Si	(Dogar et al., 2011; Marino y Onetto, 1995)
Tipo de seguro (nivel socioeconómico)	-		(Priyadarshini et al., 2011; Psoter et al., 2006)

1.5 Fundamentación de la zona geográfica del estudio

La comuna de Panguipulli reúne una serie de características que la hacen apropiada para un estudio de factores de riesgo de la CTI. Dicha comuna está situada en la provincia de Valdivia, región de Los Ríos, en el sur de Chile. Tiene una superficie de 3,292 km². La última pre-estimación censal del 2012 indica que la comuna de Panguipulli hay 33,273 habitantes, de los cuales la población rural corresponde a 17,385 en la comuna de Panguipulli. Asimismo, el 13% de la población se declara mapuche. Estos antecedentes muestran que la comuna de Panguipulli posee características que incluyen factores de riesgo de CTI reportados en la literatura. Reportes previos se han enfocado en comunas con una u otra características, ya sea en una comunidad rural o urbana (Ahn et al., 2011; Dogar et al., 2011; Marino y Onetto, 1995) y étnica o no étnica (Psoter et al., 2006; Caroline H. Shiboski et al., 2003; Caroline H Shiboski et al., 2003; Tusek et al., 2012) o no incluyen la ruralidad, etnicidad como factores a investigar (Hoffmeister et al., 2016).

1.6 Justificación del estudio

Los estudios mencionados previamente acerca de la prevalencia y factores de riesgo asociados enfatizan la naturaleza compleja y multifactorial de la CTI.

Estos estudios muestran una gradiente social en la distribución de la CTI, junto con los factores de riesgos biológicos, ambientales y conductuales. Sin embargo, la contribución de cada uno de estos factores en el contexto de poblaciones étnicas y sociocultural y/o económicamente diversas no ha sido completamente explorada. Esto es particularmente necesario con respecto a poblaciones deprivadas o multiétnicas, considerando que la globalización e inmigración van creando dentro países cada vez más multiculturales o con grupos más diferenciados, por ejemplo, económicamente. En este aspecto, Chile es el país con la mayor desigualdad dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con un índice GINI de 0.5 (promedio OCDE=0.34). Este índice mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, el gasto de consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa. Así, un índice de GINI de 0 representa una equidad perfecta, mientras que un índice de 100 representa una inequidad perfecta (BM, 2016). Por otra parte, Panguipulli presenta un alto porcentaje de población rural así como de población que declara pertenecer a un pueblo originario. Adicionalmente, el estudio de factores de riesgo conocidos en esta población diversa socioculturalmente, mediante un modelo multivariado, permitiría por un lado conocer el impacto de determinantes sociales de la salud así como identificar posibles objetivos de intervenciones para disminuir la desigualdad de la

distribución de la CTI. En vista de este escenario, el objetivo del presente estudio es medir la prevalencia de la CTI en la comuna de Panguipulli e identificar los factores de riesgo asociados a la actividad e historia de caries en población preescolar de Panguipulli.

1.7 OBJETIVOS

1.7.1 Objetivo general

Determinar la prevalencia de CTI en la población urbana-rural de Panguipulli e identificar los factores de riesgo asociados a la prevalencia y actividad de caries.

1.7.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos son:

- 1) Determinar la prevalencia de CTI en la comuna de Panguipulli.
- 2) Determinar la severidad de la CTI en la comuna de Panguipulli.
- 3) Determinar la actividad de la CTI en población Panguipulli.
- 4) Determinar las medida epidemiológica RP (razones de prevalencia) para distintos factores de riesgo conocidos en la población de Panguipulli.
- 5) Identificar mediante un modelo multivariado aquellos factores de riesgo conocidos a la prevalencia de CTI en la población de Panguipulli.

1.7.3 Hipótesis de estudio

1. La población preescolar de Panguipulli presenta una prevalencia y severidad mayor a la reportada en Chile.
2. Los factores de riesgo identificados en la población preescolar de Panguipulli se comportan de acuerdo a lo reportado en la literatura.

2 MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Diseño del estudio

El diseño del estudio corresponde a un estudio epidemiológico de corte transversal.

La primera parte del estudio se enfocó en los tres primeros objetivos específicos, (1) determinar la prevalencia de CTI en la comuna de Panguipulli, (2) determinar la severidad de la CTI en la comuna de Panguipulli y (3) determinar la actividad de la CTI en población Panguipulli, y se realizó mediante exámenes clínicos en los colegios y jardines infantiles de los participantes. La segunda parte enfocada los objetivos específicos para (4) calcular las razones de prevalencia de distintos factores de riesgo conocidos en la población de Panguipulli e (5) identificar un modelo multivariado que asocie factores de riesgo conocidos a la presencia de CTI en la población de Panguipulli se realizó mediante entrevistas telefónicas con los padres y apoderados de los participantes y el posterior análisis estadísticos de los datos obtenidos.

Este reporte sigue las recomendaciones de la iniciativa STROBE para la informe de estudios de corte transversal (von Elm et al., 2007).

2.2 Participantes

El estudio se llevó a cabo desde septiembre del 2009 hasta diciembre del 2014 en la comuna de Panguipulli, región de Los Ríos, Chile.

2.2.1 Características geográficas de la comuna de Panguipulli

La comuna de Panguipulli se ubica en la provincia de Valdivia en la región de los Ríos en el sur de Chile. Tiene un área de 3292 km² y una altitud media de 130 m. La topografía se caracteriza por un predominio de cerros y montañas andinas de hasta 2,840 metros de altura. Tiene numerosas quebradas abruptas, asociadas a fenómenos de erosión glacial. Tiene la cuenca hidrográfica binacional Lacar-Valdivia que nace en el lago Lacar en Argentina, el Pirihueico en el lado chileno, los que forman los ríos Fuy, Enco, el lago Panguipulli, Riñihue, y río San Pedro, además de los lagos Calafquen, Pellaifa, Pullinque y Neltume, entre los más grandes. Tiene un clima templado lluvioso con influencia mediterránea. La capital es Panguipulli y cuenta con 6 localidades semi-urbanas (Choshuenco, Neltume, Pullinque, Calafquen, Coñaripe, Puerto Fuy), con accesos mediante caminos de ripio. Esto hace que exista un sistema de transporte precario con viajes una a tres veces a la semana a la capital comunal. A partir del año 2010 se implementó un sistema de bus escolar diario que incluye a preescolares. Un mapa de la zona así como los colegios se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Zona geográfica y colegios y jardines participantes de la comuna de Panguipulli.

2.2.2 Características demográficas de la comuna de Panguipulli

La última estimación censal reporta una población total de 33 273 habitantes, de los cuales el 52.2% es rural y 13% se declara mapuche. La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 2003-2011 (CASEN) estimó un 9.27% de la población comunal en situación de pobreza (nivel regional 6.11, nacional 3.74%), con un ingreso promedio de \$434 236 (región \$607,155; país \$800 274) (en USD abril 2016: USD647, USD900 y USD1195 respectivamente)

Las tasas de ocupación³ al 2011 es de 43.8% mientras el promedio del país fue 51.6%. La principal ocupación de los trabajadores por rama de actividad es agricultura, ganadería, caza y silvicultura (38%) seguida de Transporte, almacenamiento y comunicaciones (24%) y administración pública y defensa, planes de seguro social afiliación obligatoria (15%) (CASEN, 2009).

La comuna cuenta con un hospital, cuatro centros de salud y ocho postas rurales. EL 94.8% de la población se declara beneficiaria del sistema público de salud FONASA, con una distribución según tramo de FONASA en A 52.1%, B 24%, C 11.2, D 12.7%. Además, la comuna presenta una tasa de natalidad de 14.1.

Los establecimientos educacionales corresponden a 35 de la Corporación municipal y 28 particulares subvencionados al año 2011. No existen colegios privados. Al año 2012 la matrícula era de 742 niños en educación parvularia y de 4 291 en educación básica. Los resultados de la prueba del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) del cuarto básico del 2011 fueron de 262 en lenguaje y 247 en matemáticas, ambos bajo los puntajes regionales (267/254) y nacionales (267/259).

³Tasa de ocupación: número de personas ocupadas como porcentaje de la población en edad de trabajar

2.3 Muestra del estudio

2.3.1 Población objetivo

La población objetivo de los resultados del presente estudio son los preescolares de Panguipulli al año 2013, estimada en 1656 niños y niñas según los datos disponibles al momento de la planificación del estudio (INE, 2013)⁴.

2.3.2 Criterios de inclusión y exclusión

La población elegible son los niños registrados en los colegios y jardines de la comuna de Panguipulli al 2013. Se incluirán todos aquellos niños cuyos apoderados hayan entregado su consentimiento para participar, tenga hasta 71 meses al momento del examen, esté sano, libre de infecciones orofaciales al momento del examen y asienta participar. Se excluirán aquellos niños de difícil manejo

2.3.3 Estimación del tamaño muestral para determinar la prevalencia puntual de CTI

EL estudio previo de Zaror et al. realizado en Calbuco, localidad situada a 298 kms al sur de Panguipulli, detectó una prevalencia del 70% de CTI en una muestra por conveniencia hospitalaria (Zaror Sánchez et al., 2011). Con esta prevalencia y considerando una población objetivo de 1656 preescolares, una prevalencia esperada del 70%, un error del

⁴A finales del 2013 se detectaron errores en el Censo, por lo que la cifra entregada tiene un error del 10%. Ver

5%. Basado en esto el tamaño muestral se calculó en la calculadora OpenEpi⁵ mediante la fórmula

$$n = [EDFF * Np(1-p)] / [(d^2 / Z^2_{1-\alpha/2} * (N-1) + p*(1-p)]$$

donde

n = tamaño muestral

EDFF = efecto del diseño (1 para muestras aleatorias)

N = tamaño de la población

p = proporción estimada

$Z^2_{1-\alpha/2}$ = intervalo de confianza

d = precisión deseada

Se obtuvo un mínimo de 271 preescolares a examinar para el estudio.

2.3.4 Tipo de muestreo

Se utilizó un muestreo aleatorio simple. Se obtuvo el registro de matriculados al 2013. Se enumeraron los registros del 1 al 1656. En el listado final de niños matriculados había 1298 registros. Se consideró un adicional del 10% al tamaño muestral estimado previamente. Se invitó a los padres a participar, y entre los participantes se seleccionó la muestra. Se generó una secuencia de 350 números aleatorios mediante la función *random* en una planilla de cálculo Libreoffice Calc(c) con aquellos preescolares cuyos padres aceptaron participar del estudio hasta completar el tamaño muestral requerido.

⁵<http://www.openepi.com/SampleSize/SSPropor.htm>

2.3.5 Reclutamiento

Se coordinó con los profesores y directivos de los distintos colegios para acudir a las reuniones de apoderados y así invitar a participar a los apoderados de los preescolares al estudio. Como incentivo se ofreció un kit de higiene bucal a los participantes y una charla de cuidados de la salud oral en los colegios participantes. Se informó a los apoderados con antecedentes étnicos de la decisión de su jefe tribal respectivo. Aceptaron participar 425 apoderados de 433 preescolares.

2.3.6 Estimación del tamaño muestral para asociar factores de riesgo

Se utilizó el supuesto de Freeman, quien sugirió que para realizar análisis multivariados manteniendo una potencia estadística del 80% y un error alfa de máximo 5% el tamaño de la muestra tiene que ser a lo menos diez veces el número de variables independientes a estimar más uno, según la fórmula

$$n = 10 \times (k + 1)$$

donde n es el tamaño muestral y k las variables independientes (Freeman, 1987). Esto entrega un tamaño muestral mínimo para la evaluación de 20 variables o factores de riesgo en 210 preescolares.

2.4 Definiciones de variables

La variable a medir en el estudio de prevalencia y que servirá de variable respuesta para el estudio de casos y controles es la presencia de caries temprana de la infancia en preescolares (CTI), que corresponde a una o más superficies dentarias cariadas (cavitadas o no

cavidades), perdida por caries u obturada en cualquier diente temporal, en niños de hasta 71 meses de edad (American Academy of Pediatric Dentistry, 2008). La definición operacional de caries corresponderá al criterio de la OMS (World Health Organization, 1997) para dentición temporal con la modificación propuesta por Pitts que incluye lesiones de caries no cavitadas, consignandose como c_1 para la lesión no cavitada o mancha blanca de esmalte o como c_3 para la lesión cavitada en dentina (Pitts, 2009). El examen no considera el uso de radiografías.

2.4.1 Variable dependiente

La caries dental fue registrada mediante el examen clínico directo de cada niño.

2.4.1.1 Prevalencia

La prevalencia de caries corresponde a una variable continua proporcional. Se consideró como preescolar con caries a cualquier preescolar con al menos un diente obturado por caries, extraído por caries o con caries según el criterio de la OMS (OMS, 1997), esto es, a nivel de caries cavitada. Se obtuvo adicionalmente la prevalencia considerando las lesiones de caries no cavitadas (criterio OMS modificado por Pitts). Considerando que esta definición incluye consecuencias de la caries, como un diente obturado o perdido por caries, la prevalencia representa la historia de caries del individuo. Para efectos del análisis de riesgo de historia de caries, cada niño se clasificó de manera dicotómica nominal en con o sin caries.

2.4.1.2 Actividad

La actividad de caries corresponde a una variable continua proporcional. Se utilizó el criterio de Nyvad para definir a una lesión activa como aquella que al examen clínico luego de limpiar y secar la superficie del diente se perciba una superficie dentaria de esmalte o dentina opaca y sin brillo (Nyvad et al., 1999). La actividad representa el estado actual de caries del individuo. Para efectos del análisis de riesgo, cada niño se clasificó de manera dicotómica nominal en con o sin actividad de caries.

2.4.1.3 Severidad

La severidad de caries corresponde a una variable continua proporcional y se obtuvo de la suma de dientes cariados (criterio OMS), obturados o perdidos por caries por niño. Esto da lugar al índice ceod que va del mínimo 0 a un máximo de 20.

2.4.2 Variables independientes

En base a la revisión bibliográfica planteada y al tamaño muestral calculado, se procedió a seleccionar 20 factores de riesgo conocidos de la CTI para evaluar su asociación en la población preescolar de Panguipulli.

Las variables independientes fueron recolectadas con la aplicación de un formulario mediante una encuesta telefónica a excepción de la variable placa dental, que fue recolectada durante el examen clínico.

2.4.2.1 Placa dental

Correspondió a una variable dicotómica nominal evaluada clínicamente por cada examinador mediante examen clínico visual directo de la cara vestibular de los dientes anterosuperiores. La presencia de placa dental se clasificó como riesgo (Parisotto et al., 2012). Se tabuló como variable nominal con dos niveles (no, si).

2.4.2.2 Cepillado

Variable dicotómica nominal del relato del apoderado acerca de la frecuencia de cepillado de su hijo o pupilo. Se preguntó al padre o apoderado cuantas veces se lavaba los dientes su hijo o pupilo y se clasificó en menos de dos como riesgo y dos o más como no riesgo. (Hsieh et al., 2012). Se tabuló como variable nominal con dos niveles (no, si).

2.4.2.3 Pasta dental

Variable dicotómica nominal del relato del apoderado acerca del uso de pasta dental fluorada durante el cepillado. Se registró como riesgo cuando estaba ausente (Uribe et al., 2014). Se tabuló como variable nominal con dos niveles (no, si).

2.4.2.4 Uso de mamadera con azúcar diurna

Variable dicotómica nominal del relato del apoderado acerca del uso o administración diurno por parte de un adulto de mamadera o biberón con líquidos azucarados distintos de jugo o bebida. Su presencia se

registró como riesgo (Sankeshwari et al., 2012). Se tabuló como variable nominal con dos niveles (no, si).

2.4.2.5 Uso de mamadera con azúcar nocturna

Variable dicotómica nominal del relato del apoderado acerca del uso o administración antes de dormir por parte de un adulto de mamadera o biberón con líquidos azucarados distintos de jugo o bebida. Su presencia se registró como riesgo (Sankeshwari et al., 2012). Se tabuló como variable nominal con dos niveles (no, si).

2.4.2.6 Consumo de jugos naturales

Variable dicotómica nominal del relato del apoderado acerca del consumo por parte del menor de jugos naturales, esto es, extraídos directamente de la fruta y sin añadidos de azúcar. Su ausencia se clasificó como riesgo (Sealy et al., 2011). Se tabuló como variable nominal con dos niveles (no, si).

2.4.2.7 Consumo de bebidas azucaradas

Variable dicotómica nominal del relato del apoderado acerca del consumo por parte del menor de bebidas carbonatadas o azucaradas comerciales. Su presencia se clasificó como riesgo (Bowen y Lawrence, 2005). Se tabuló como variable nominal con dos niveles (no, si).

2.4.2.8 Asistencia a control odontológico anual

Variable dicotómica nominal del relato del apoderado acerca de la asistencia del menor a control o tratamiento odontológico en los últimos

12 meses. Su ausencia se clasificó como riesgo (Werneck et al., 2008). Se tabuló como variable nominal con dos niveles (no, si).

2.4.2.9 Asistencia a control médico anual

Variable dicotómica nominal del relato del apoderado acerca de la asistencia del menor a control o tratamiento médico en los últimos 12 meses. Su ausencia se clasificó como riesgo (Long et al., 2012). Se tabuló como variable nominal con dos niveles (no, si).

2.4.2.10 Presencia de huerta en casa

Variable dicotómica nominal del relato del apoderado acerca de la disponibilidad de una huerta en casa que permita el consumo de frutas o verduras de manera regular. Su presencia se clasificó como no riesgo (Touger-Decker y van Loveren, 2003).

2.4.2.11 Disponibilidad de agua potable en casa

Variable dicotómica nominal del relato del apoderado acerca de la disponibilidad de agua potable en el domicilio del menor. Se asume que un preescolar con agua potable domiciliaria conectada a la red de Aguas Décima proveía de agua con una concentración de flúor de 0.939ppm (Gómez, 2010). La ausencia se registró como riesgo. Se utilizó como proxy de nivel socio-económico (Priyadarshini et al., 2011). Se tabuló como variable nominal con dos niveles (no, si).

2.4.2.12 Disponibilidad de luz eléctrica en casa

Variable dicotómica nominal del relato del apoderado acerca de la disponibilidad de energía eléctrica domiciliaria. Su ausencia se registró como riesgo. Se utilizó como proxy de nivel socioeconómico (Priyadarshini et al., 2011). Se tabuló como variable nominal con dos niveles (no, si).

2.4.2.13 Etnicidad

Se utilizaron tres medidas para evaluar la consistencia de la etnicidad como factor de riesgo, todas mediante auto reporte (Sapunar et al., 2003). No existen reportes de prevalencia o riesgo para este grupo etareo. Distintos estudios internacionales sugieren el rol de la etnicidad como proxy de nivel socioeconómico o de población con barreras de acceso a la atención sanitaria (Ballesteros et al., 1977; Fisher-Owens et al., 2012; Kim et al., 2012; Psoter et al., 2006; Quandt et al., 2009; Shiboski et al., 2003; Sundby y Petersen, 2003). Se tabuló como variable nominal con dos niveles (no, si).

2.4.2.13.1 Familia se reconoce mapuche

Variable dicotómica nominal del reconocimiento del apoderado de la pertenencia al pueblo mapuche por parte del grupo familiar. Su presencia se registró como riesgo. Se tabuló como variable nominal con dos niveles (no, si).

2.4.2.13.2 Apoderado se reconoce mapuche

Variable dicotómica nominal del reconocimiento del apoderado de su pertenencia al pueblo mapuche. Su presencia se registró como riesgo. Se tabuló como variable nominal con dos niveles (no, si).

2.4.2.13.3 Idiomas que se hablan en casa

Variable dicotómica nominal del reconocimiento del apoderado de los idiomas que se hablan en casa. Se clasificó como riesgo las respuestas de solo mapuche o castellano y mapuche. Se tabuló como variable nominal con dos niveles (no, si).

2.4.2.13.4 Número de apellidos mapuches

Se registró el número de apellidos mapuches de cada niño. Si bien es factible que un niño con dos apellidos no mapuches tenga dos abuelos con sus segundos apellidos mapuches, se consideró solo los apellidos del menor para evaluar una probable asociación entre etnicidad y la CTI. Se consignó como cero apellidos, uno y dos apellidos. Se tabuló como variable nominal con dos niveles (no, si).

2.4.2.14 Educación de los padres

Se clasificó de manera dicotómica nominal el reconocimiento de cada apoderado acerca del último curso de educación aprobado. Se clasificó como riesgo cuando un apoderado declaraba no haber completado la educación básica. Se utilizó como proxy de nivel socioeconómico (Dye et al., 2011). Se tabuló como variable nominal con dos niveles (no, si).

2.4.2.15 Ruralidad

Se clasificó mediante el registro del domicilio del menor, clasificando como rural cuando el menor vivía en una localidad con menos de 2000 habitantes según la información censal del 2012 (INE, 2002). El vivir en zona rural se clasificó como riesgo (Dogar et al., 2011; Marino y Onetto, 1995). Se tabuló como variable nominal con dos niveles (no, si).

2.4.2.16 Tipo de vivienda

Variable dicotómica nominal del reporte del apoderado acerca del tipo de vivienda que habita. Se clasificó como riesgo las respuestas de vivienda arrendada o allegado. Se utilizó como proxy de nivel socioeconómico (Thomson y Mackay, 2004). Se tabuló como variable nominal con dos niveles (no, si).

2.5 Fuente de datos

2.5.1 Calibración y acuerdo inter e intraobservadores para la evaluación de CTI

Se realizaron seis sesiones de calibración para un equipo de cuatro examinadores. Se utilizaron los criterios de la OMS para la detección y registro de caries (OMS, 1997) y se modificaron con los criterios de Pitts (2009) para incluir aquellas lesiones de caries no cavitadas. La actividad se registró utilizando los criterios de Nyvad (1999). Tres sesiones fueron teóricas con un datashow y tres prácticas con pacientes en el Consultorio Externo de Valdivia. El investigador principal estuvo a cargo de la calibración y se consideró el gold estándar. Se repitieron las

calibraciones hasta que se alcanzó un acuerdo kappa interexaminador de 82% e intraexaminador de 87%. El cálculo se realizó mediante el paquete irr de R (Gamer et al., 2012) utilizando kappa de Cohen no ponderado.

2.5.2 Examen clínico

Los exámenes fueron realizados en el lugar de estudio de los niños, con el paciente sentado en una silla y el operador situado frente al menor. Se explicó y ejemplificó mediante la técnica decir-mostrar-hacer (Farhat-McHayleh et al., 2009) y luego se invitó a los menores cuyos padres o apoderados habían dado su consentimiento a participar. Los menores incluidos fueron quienes asintieron en participar. El procedimiento clínico incluyó la utilización de gasa para la limpieza de biofilm y secado de las superficies dentarias visibles. La observación directa fue realizada con luz artificial provista por una linterna de cabeza modelo Duracell Daylite LED 3-AA (Duracell, Procter&Gable, China). Se usaron guantes de látex desechables, mascarillas, espejo intraoral n° 5 y sonda periodontal tipo OMS (Hu-Friedy WHO Screening Probe, Hu-Fredy, Chicago, USA) para verificar lesiones de caries cavitadas. Las observaciones fueron registradas por un segundo examinador que no participó del examen clínico en una ficha ad hoc, donde además se recopilaron datos demográficos. Cada examen duró entre 10 a 15 minutos y se visitó dos o tres veces cada escuela hasta examinar a los niños seleccionados.

2.5.2.1 Definiciones operacionales de para el diagnóstico dentario

Para medir la severidad del daño de caries, se identificó tanto la presencia o ausencia de caries (lesiones cavitadas o no cavitadas) como la historia de caries, identificando aquellos dientes que han sido obturados o perdidos debido a caries.

2.5.2.1.1 Definición. Corona sana

Una corona se registró como sana si no muestra signos de caries clínica tratada o sin tratar.

2.5.2.1.2 Definición. Corona con caries

Se registró como C1 todas aquellas lesiones iniciales no cavitadas (mancha blanca) limitada a esmalte (Criterio de Pitts incluido en este estudio). Los datos se registraron utilizando la nomenclatura internacional (FDI) para dentición temporal, la cual divide a la boca en cuatro cuadrantes y se le asigna un número a cada uno de ellos del 5 al 8 en sentido horario (cada diente lleva el número del cuadrante seguido de un punto y otro número que indica la posición en el cuadrante, desde el 1 al 5 comenzando por el incisivo central.. Se registró la actividad de la lesión en (1) activa o (2) detenida. Serán activas todas aquellas lesiones recubiertas de biofilm, con aspecto opaco y blanquecino. Se consideraron inactivas aquellas lesiones brillantes, oscuras y sin biofilm.

Se registró con la letra c del índice ceo. Se añadió el número 3 (c3) para indicar que se refiere a lesiones dentinarias cavitadas. Se registró

la presencia de caries cuando una lesión se presenta en una fosa o fisura, o en una superficie dental lisa, tiene una zona blanquecina opaca, usualmente cubierta con biofilm, distinta de hipoplasia o una cavidad inconfundible, un esmalte socavado o un suelo o pared apreciablemente ablandado. También se incluyó en esta categoría un diente con una obturación temporal o un diente que está obturado pero también cariado. En los casos en los que la corona ha sido destruida por la caries y sólo queda la raíz, se consideró que la caries se ha iniciado en la corona y por ello se clasifica sólo como caries de la corona. Se utilizó la sonda para confirmar los signos visuales de caries en las superficies oclusal, bucal y lingual. En caso de duda, se registró el diente como sano.

2.5.2.1.3 Definición. Corona obturada con caries

Se consideró que una corona está obturada con caries cuando tiene una o más restauraciones permanentes y una o más zonas que están cariadas. Se registró con la letra o del índice ceo.

2.5.2.1.4 Definición. Corona obturada sin caries

Se consideró que una corona está obturada sin caries, cuando se hallan una o más restauraciones permanentes y no existe ninguna caries en la corona. Se incluyó en esta categoría un diente con una corona colocada debido a una caries anterior. Se registró con la letra e del índice ceo.

2.5.2.1.5 Definición. Diente perdido como resultado de caries

Se utilizó este código para los dientes permanentes o temporales que han sido extraídos debido a la presencia de caries, incluyendo el registro en el estado de la corona. Para los dientes temporales perdidos, este grado se empleó sólo si el sujeto presenta una edad en que la exfoliación normal no sería explicación suficiente de la ausencia.

2.5.3 *Diseño y adaptación del cuestionario para la evaluación de factores de riesgo*

Se modificaron cuestionarios utilizados en investigaciones previas (Al-Jewair y Leake, 2010; Deichsel et al., 2012). La validez de contenido y constructo se asumió de los estudios previos. Se tradujeron de su idioma de origen y adaptaron transculturalmente. Una primera versión fue probada por el facilitador cultural en una muestra de cinco padres que no fueron incluidos en el estudio. En base a su retroalimentación se modificó y una segunda versión fue evaluada en conjunto por el investigador principal y el facilitador cultural en una muestra de cinco apoderados de la zona que luego no fueron incluidos en el estudio. Se realizó una prueba test-retest con 14 días de diferencia obteniendo un valor kappa de Cohen de 0.81 (IC95% [0.64, 0.97]) que fue considerado bueno.

Las respuestas positivas del test se codificaron como 10 y se calculó el coeficiente de correlación de Pearson (r) como medida de la consistencia entre los dos sets de respuestas, obteniendo un valor de

0.87 considerado moderado para los factores de riesgo del área clínica, 0.92 (alto) para familiar y 0.97 para social (alto). Se excluyeron las fichas incompletas.

Este cuestionario fue utilizado luego de los exámenes clínicos. Así, luego del examen de los preescolares, se procedió a entrevistar a los padres o apoderados, a objeto de completar un cuestionario con las variables predictoras. Un entrevistador realizó la entrevista de manera personal o telefónica a aquellos padres y apoderados que hayan consentido participar. Este método de recolección de información ha sido utilizado en estudios similares realizados en poblaciones de pueblos aborígenes por Shiboski et al. (2003) y Psoter et al. (2006). Para la etnicidad se consideró el autoreconocimiento mapuche según el reporte previo de Sapunar et al., 2003 en población mapuche. Para el análisis final se utilizaron sólo aquellos datos provenientes de cuestionarios completos

2.5.4 Tabulación y almacenamiento de datos del examen clínico y de factores de riesgo

2.5.4.1 Recolección de datos

Luego que se completaron los cuestionarios en formato físico, esto fueron ingresados en formularios digitales ad-hoc diseñados en Google Docs. La variable respuesta caries se codificó mediante el índice ceo por diente y luego se dicotomizó en paciente con CTI o sin CTI y en activo o inactivo según la actividad de caries Las variables predictoras

se dicotomizaron para evaluar la presencia o ausencia de exposición. Los ítemes fueron recodificados para asegurar la misma dirección en cuanto al riesgo.

2.5.4.2 Validación de los datos

Los ítemes de los formularios solo permitían el ingreso mediante la selección de entradas prediseñadas para disminuir el error de ingreso.

2.5.4.3 Manejo de datos perdidos

Las fichas con datos incompletos fueron descartadas del análisis final.

2.5.4.4 Ingreso de datos

Dos digitadores estuvieron a cargo del ingreso de datos en los formularios. Un examinador externo revisó 35 fichas seleccionadas al azar contra los datos ingresados para descartar la presencia de errores.

2.5.4.5 Almacenamiento de datos

Las fichas clínicas fueron recopiladas y almacenadas por el investigador principal. Los datos ingresados a los formularios se mantienen en dos base de datos de acceso con contraseña. Los datos crudos anonimizados están disponibles en

2.6 Análisis estadísticos

Los datos fueron exportados desde Google Docs en formato csv e importados para su análisis mediante el software estadístico R (R Core Team, 2013). Se utilizaron los paquetes epicalc (Chongsuvivatwong,

2012), prevalence (Devleesschauwer et al., 2015), reshape2 (Wickham, 2007), car (Fox y Weisberg, 2011), plyr (Wickham, 2011), Hmisc (Jr et al., 2016), lubridate (Grolemund y Wickham, 2011), ggplot2 (Wickham, 2009), dplyr (Wickham y Francois, 2015) y tidyr (Wickham, 2016)

2.6.1 Análisis descriptivos demográficos

Se calcularon estadísticas descriptivas demográficas de edad y sexo para la muestra se generaron tablas y gráficos. Las comparaciones de proporciones entre grupos se evaluó mediante chi cuadrado. La comparación de medias entre grupos mediante el test t de Student. La normalidad de los datos se evaluó mediante el test Shapiro-Wilk. Las diferencias de medias entre grupos se evaluó mediante ANOVA con post hoc de Tukey. El nivel de significancia se fijó en 5%.

2.7 Aspectos éticos

2.7.1 Protocolo del estudio

El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité de Ética Científica del Servicio de Salud Valdivia el 25 de junio 2014 ordinario #225.

2.7.2 Consentimiento comunitario

Se solicitó el consentimiento comunitario a los jefes tribales del pueblo mapuche, principal etnia presente en la zona del estudio.

2.7.2.1 Facilitador cultural

Se contó con la colaboración remunerada de un antropólogo como facilitador cultural quien hizo los contactos con los jefes tribales de la zona y organizó la reunión donde se pidió la colaboración de la comunidad. Tres jefes tribales aceptaron y uno rechazó.

2.7.3 Consentimientos individuales

Se coordinaron visitas con los directores y profesores de los colegios para entregar las invitaciones a participar, participar en reuniones de padres y apoderados y entregar los formularios de consentimiento informado a los padres y apoderados de los menores. Posteriormente se examinó a los menores que tuvieran su consentimiento firmado por su padre o apoderado y que asintiera participar. No se recolectaron muestras biológicas.

2.7.4 Financiamiento

El estudio se financió con recursos propios. La empresa Colgate-Palmolive donó los sets de higiene bucal que fueron entregados como incentivo para participar a los menores. Los sets sobrantes se entregaron a los profesores de los colegios participantes una vez finalizado el estudio.

2.7.5 Incentivos a los participantes

Se entregó a los participantes un kit de higiene bucal compuesto de un cepillo, un libro para colorear con contenidos de educación dental y una pasta dental fluorada.

2.7.6 Estimación de la prevalencia puntual de CTI

2.7.6.1 Prevalencia puntual de caries temprana de la infancia

La prevalencia puntual fue calculada mediante la fórmula niños con a lo menos un diente con caries (c_3), obturado o perdido por caries dividido por el total de la muestra. EL intervalo de confianza fue calculado de la siguiente manera:

- Se calculó el error estándar: $es = \sqrt{\frac{Prevalencia * 1 - prevalencia}{n}}$
; donde n=tamaño muestral.
- Luego se calculó el margen de error: $err = qnorm \times 0.975 \times es$;
donde qnorm es el inverso de la función de probabilidad normalmente distribuida.
- El intervalo de confianza al 95% entonces resulta de $prevalencia \pm err$ para los límites superior e inferior.

Estos cálculos se hicieron para toda la muestra y por separado para niños y niñas.

2.7.6.2 Severidad de caries temprana de la infancia

La severidad de la CTI se obtuvo de la suma de los componentes c, e y o. Se obtuvo un índice que incluye las lesiones no cavitadas denominado c_1c_3eod y el que incluye solo lesiones cavitadas c_3eod que corresponde al estándar de la OMS. La racionalidad de esto es poder comparar, mediante el c_3eod los resultados con los estudios disponibles que reportan solo lesiones cavitadas y mediante el c_1c_3eod obtener el dato de las lesiones que son susceptibles de ser tratadas mediante intervenciones preventivas o no invasivas.

Este índice representa tanto las caries actuales en el componente c como la historia de caries en los componentes e y o.

2.7.6.3 Actividad de caries temprana de la infancia

La actividad se calculó clasificando cada niño con activo si tenía al menos una caries activa. En caso contrario se clasificó como no activo. La actividad de caries mide la presencia actual de caries.

2.7.7 Análisis de factores de riesgo

2.7.7.1 Determinación de las razones de prevalencia

Se construyeron tablas de contingencia para el cálculo de las razones de prevalencia. Este indicador se calculó mediante la fórmula

$$n = 10 \times (k + 1) .$$

Se calculó además el intervalo de confianza al 95% para detectar aquellos factores con una razón de prevalencia cuyo límite inferior fuera superior a 1, los que fueron clasificados como factores de riesgo y aquellos cuyo límite superior fue menor a 1 fueron clasificados como factores protectores. El intervalo de confianza para la razón de prevalencia se calculó mediante la fórmula

$$es = \sqrt{\frac{Prevalencia * 1 - prevalencia}{n}} ; \text{ con los términos que se muestran en la}$$

Tabla 6.

Se consideró como factor de riesgo todo aquel con una $RP > 1$ y cuyo límite inferior del IC 95% > 1

Tabla 6. Términos para el cálculo de la razón de prevalencia (RP) y su intervalo de confianza al 95% (IC95%).

	Con CTI	Sin CTI	Total
Expuestos (1)	x_1	$n_1 - x_1$	n_1
No expuestos (2)	x_2	$n_2 - x_2$	n_2

2.7.7.2 Análisis bivariados

Se elaboraron tablas de contingencia para cada uno de los factores de riesgo y la variable respuesta presencia de caries para el cálculo de frecuencias de las variables discretas. La variable respuesta fue historia de caries, esto es índice $c_3eod > 0$. Se verificó la probable asociación evaluando la independencia de las variables mediante el test de chi-cuadrado según la fórmula siguiente:

$$\chi^2_{norm} \times 0.975 \times es$$

donde χ^2 es el estadístico chi cuadrado, k es cada intervalo, O es la proporción observada y E la esperada. La bondad del ajuste, esto es, si un determinado modelo se ajusta a los datos (Diez et al., 2014), extrayendo del resultado del test de chi cuadrado las frecuencias del modelo esperado y comparándolas con las del modelo observado, mediante la función de R `chisq.test(modelo)$expected`. La diferencia se obtuvo mediante el comando `chisq.test(modelo)$residuals`. La hipótesis

nula correspondió a que el factor se distribuía por igual entre los preescolares con y sin CTI.

2.7.7.3 Análisis multivariado

Los análisis de chi cuadrado permiten evaluar la independencia de las variables pero no asumen un modelo, esto es, la presencia de una variable dependiente y una o varias independientes. Para evaluar la presencia de una asociación entre las variables independientes, los factores de riesgo, y la variable respuesta o dependiente, esto es la presencia de CTI, se utilizó un modelo de regresión logística multivariada. Todas las variables independientes fueron recodificadas para asegurar la dirección de todos los ítems, con 0=no riesgo y 1=riesgo de CTI y se utilizó sexo y género como variables de ajuste. La variable respuesta fue la presencia de CTI.

3 RESULTADOS

Se invitó mediante comunicaciones vía colegio y directamente en los colegios a todos los padres de menores hasta 71 meses de edad. De 1298 menores menores de 71 meses matriculados en colegios y jardines de la comuna de Panguipulli, aceptaron 425 padres y apoderados que representan a 433 niños. Los niños evaluados fueron 375 y de estos las fichas sin errores fueron 330. Con estos datos se calculó la prevalencia, severidad y actividad de CTI. Luego, 235 padres y apoderados respondieron el cuestionario de riesgo, y de estos se obtuvieron 213 cuestionarios completos, con los que se realizaron los análisis de riesgo.

3.1 Resultados demográficos

La muestra estuvo conformada por 330 preescolares entre los 2 a 5 años de edad de 12 colegios y jardines infantiles de la comuna de Panguipulli. Las principales características demográficas se muestran en la Tabla 7.

Tabla 7. Descripción demográfica de los 330 participantes del estudio.

		Sexo	
		Niños	Niñas
Edad	Promedio (desviación estándar)	4.4 (0.74)	4.3 (0.74)
	Mediana	5.0	4.0
Edad (años)	2 a 2.9	5	3
	3 a 3.9	16	14
	4 a 4.9	84	50
	5 a 5.9	73	85
Total		178	152

3.2 Descripción de la prevalencia de caries temprana de la infancia

3.2.1 Prevalencia puntual e IC

La prevalencia puntual de CTI (95%IC) de los participantes fue de 66.4 % (IC95% [61.3, 71.5]). Para niños fue de 71% IC95%[0.64, 0.78] y para niñas del 62% IC95[0.55, 0.69]. No se observó diferencia significativa en la proporción de niños y niñas con CTI ($\chi^2 = 2.3998$, $gl = 1$, $p = 0.12$) según se observa en la Figura 4.

Figura 4. Prevalencia puntual de CTI por género y total. Línea de error = 95% IC.

La prevalencia por edad y género se muestra en la Tabla 8.

Tabla 8. Prevalencia por género y edad, Panguipulli 2013-2014. Número (porcentaje por edad).

Edad	Niños	Niñas
2	1 (33.3)	4 (80.0)
3	7 (50.0)	14 (87.5)
4	38 (76.0)	47 (55.9)
5	62 (72.9)	46 (63.0)

Se hicieron subanálisis para aquellos participantes cuyos padres completaron el cuestionario de factores (n=210). Se evaluó la prevalencia de caries entre niños de familias que se declararon mapuches, encontrando una diferencia significativa en la proporción (chi cuadrado = 8.33, df = 1, p = 0.0039) el resultado que se muestra en la tabla Tabla 9 con una muestra de 210 preescolares que corresponden a aquellos cuyos padres contestaron la encuesta de riesgo.

Tabla 9. Proporción de niños cuyas familias se declaran mapuches y presencia de caries. (p=0.0036)

		Presencia de caries		Total
		Sin caries	Con caries	
Familia se declara mapuche	No	52	58	110
	Si	27	73	100
	Total	79	131	210

El análisis definitivo se realizó mediante un modelo multivariado ajustando por condición socioeconómica y ruralidad, el que se verá más adelante.

3.2.2 Severidad de CTI

La severidad de la CTI en los participantes fue de promedio (desviación estándar): $c_1=0.9$ (1.7), $c_3=2.3$ (3.5), $e=0.1$ (0.5) y $o=0.7$ (1.5). Los índices fueron $c_1c_3eod=4.1$ (4.5) y $c_3eod= 3.1$ (3.8). El detalle por edad y sexo se muestra en la **Tabla**.

El detalle por diente se observa en la Figura donde se aprecia el patrón característico de la CTI, con una mayor severidad en los dientes anterosuperiores y molares tanto maxilares como mandibulares, mientras que los dientes incisivos temporales mandibulares se encuentran con el menor daño por caries.

Tabla 10. Severidad de la caries temprana de la infancia en la población preescolar de Panguipulli, 2013-2014. Se muestran los promedios (desviación estándar)

	Niñas				Niños				Todos									
Edad	c ₁	c ₃	e	o	c ₁ c ₃ eod	c ₃ eod	c ₁	c ₃	e	o	c ₁ c ₃ eod	c ₃ eod	c ₁	c ₃	e	o	c ₁ c ₃ eod	c ₃ eod
2	1.8 (3.0)	2.4 (3.4)	0 (0)	0.4 (0.9)	4.6 (5.5)	2.8 (3.1)	0 (0)	0 (0)	0.7 (1.2)	0 (0)	0.7 (1.2)	0.7 (1.2)	1.1 (2.5)	1.5 (2.8)	0.3 (0.7)	0.3 (0.7)	3.1 (4.7)	2.0 (2.7)
3	1.0 (1.4)	3.0 (2.6)	0.2 (0.5)	0.6 (1.5)	4.8 (3.7)	3.8 (3.5)	0.5 (1.3)	1.6 (2.4)	0.3 (1.1)	0.6 (1.3)	2.9 (4.2)	2.4 (3.7)	0.8 (1.4)	2.3 (2.6)	0.2 (0.8)	0.6 (1.4)	3.9 (4.0)	3.1 (3.6)
4	1.0 (2.0)	1.8 (2.8)	0 (0.2)	0.6 (1.4)	3.4 (4.4)	2.5 (3.5)	1.0 (1.3)	2.2 (3.2)	0 (0)	0.3 (0.9)	3.4 (3.7)	2.4 (3.3)	1.0 (1.8)	1.9 (2.9)	0 (0.1)	0.5 (1.2)	3.4 (4.1)	2.4 (3.4)
5	0.8 (1.5)	2.5 (3.5)	0.2 (0.6)	0.6 (1.3)	4.1 (4.6)	3.3 (4.0)	0.9 (1.8)	3.0 (3.7)	0.2 (0.5)	1.1 (1.9)	5.2 (4.9)	4.3 (4.3)	0.9 (1.7)	2.7 (3.6)	0.2 (0.6)	0.9 (1.6)	4.7 (4.8)	3.8 (4.2)
Total general	0.9 (1.8)	2.2 (3.1)	0.1 (0.4)	0.6 (1.4)	3.8 (4.4)	2.9 (3.7)	0.9 (1.6)	2.5 (3.4)	0.2 (0.5)	0.8 (1.6)	4.3 (4.5)	3.4 (4)	0.9 (1.7)	2.3 (3.3)	0.1 (0.5)	0.7 (1.5)	4.1 (4.5)	3.1 (3.8)

Figura 5. Desglose de la severidad por diente, Panguipulli, 2013-2014.

3.2.3 Actividad de CTI

El 57.9% de los participantes tenía al menos una lesión de caries activa. El estrato que tenía más lesiones activas fueron las niñas de 3 años (Tabla

Tabla 11. Actividad de caries por sexo y edad en porcentaje (desviación estándar).

Edad	Niñas	Niños	Total
2	60.0 (54.8)	0.0 (0.0)	37.5 (31.8)
3	81.3 (40.3)	42.9 (41.4)	63.3 (49.9)
4	48.8 (50.3)	70.0 (46.3)	56.7 (49.7)
5	57.5 (49.8)	60.0 (49.3)	58.9 (49.4)
Total	55.6 (49.8)	60.5 (49.9)	57.9 (49.5)

Al cruzar las variables presencia de caries con la actividad de caries, se observa que hay 111 niños sin caries cavitadas pero con lesiones activas, según se observa en la Tabla.

Tabla 12. Actividad y presencia de CTI.

		Actividad de caries		Total
		Activa	Inactiva	
Historia de caries	Sano	0	111	111
	Con CTI	191	28	219
Total		191	139	

3.3 Análisis bivariados de riesgo

El análisis de riesgo incluyó a los 213 preescolares cuyos padres completaron el cuestionario de riesgo. De estos el 43% declaraba vivir en zona rural, 48% declaraba al grupo familiar como mapuche y 43% estaban en el seguro de salud FONASA A, que en Chile corresponde a indigentes o carentes de recursos.

3.3.1 Razones de prevalencia de los factores de riesgo para la CTI

Los factores de riesgo con un IC95% de su razón de prevalencia mayor a 1 fueron la presencia de placa, la falta de control odontológico, el consumo de bebidas azucaradas, reporte del uso de idioma mapuche en casa, que la familia se declare mapuche, el que carezca de huerta y que viva en zona rural. El que tiene el mayor mayor valor es el hablar idioma mapuche en casa (RP=7.29 IC95%[1.08, 49.17] seguido de la carencia de huerta (RP=2.32 IC95%[1.45, 3.71]). El detalle se muestra en la Tabla 13. No se calculó para luz eléctrica porque solo 8 de los 213 carecía de electricidad.

Tabla 13. Razones de prevalencia. Con * aquellas con un límite inferior del IC 95% > 1.

Área	Factor de riesgo	Razón de prevalencia	IC 95%
Clínico	Presencia de Placa Dental	1.81*	1.28, 2.50
	Cepillado deficiente (no supervisado)	1.34	0.94, 1.91
	Pasta deficiente	1.06	0.53, 2.12
	Sin control odontológico	1.48*	1.04, 2.11
	Sin control médico	1.71	0.75, 3.88
Familiar	Uso mamadera diurna	0.85	0.55, 1.31
	Uso mamadera nocturna	0.74	0.50, 1.09
	Consumo bebidas azucaradas	1.72*	1.22, 2.42
	Sin consumo jugos sin azúcar extrínseca	1,00	0.63, 1.59
	Se habla idioma mapuche en casa	7.29*	1.08, 49.17
Social	Familia se declara mapuche	1.87*	1.27, 2.74
	Casa sin huerta	2.32*	1.45, 3.71
	Casa sin agua potable	0.40	0.20, 0.80
	Casa sin luz eléctrica	-	
	Vive en zona rural	1.66*	1.14, 2.41

3.3.2 Independencia de las proporciones

Al evaluar las proporciones se obtuvieron diferencias significativas entre las proporciones de niños que presentaban placa dental ($p < 0.01$), consumo de bebida ($p < 0.01$), carece de huerta ($p < 0.01$), o de agua potable ($p < 0.01$). Además la etnicidad apareció con proporciones diferentes de manera significativa, por ejemplo, la familia se declara mapuche ($p < 0.01$), o el apoderado ($p = 0.01851$) o se habla mapudungun en casa ($p < 0.01$). El residir en zona rural ($p < 0.01$) o tener seguro de salud FONASA A ($p < 0.01$). El que la madre declare tener educación básica incompleta ($p < 0.01$), más no el padre ($p = 0.3081$) tuvo una proporción significativamente distinta de niños afectados por CTI. El resumen se muestra en la Tabla 14.

Tabla 14. Análisis bivariado de la independencia de variables.

Área	Factor de riesgo	Pearson's χ^2 con corrección de Yates	P
Clínico	Presencia de Placa Dental	14.554	<0.01
	Cepillado deficiente	1.4719	0.225
	Pasta deficiente	4.1968e-31	0.999
	Sin control odontológico	3.2389	0.071
	Sin control médico	0.1948	0.658
Familiar	Uso mamadera diurna	0.32951	0.565
	Uso mamadera nocturna	0.067939	0.794
	Consumo bebidas azucaradas	11.059	<0.01
	Sin consumo jugos sin azúcar extrínseca	8.3044e-31	0.999
	Se habla idioma mapuche en casa	7.2374	0.007
Social	Familia se declara mapuche	7.4377	0.006
	Casa sin huerta	11.593	<0.01
	Casa sin agua potable	5.6177	0.017
	Casa sin luz eléctrica	3.5078	0.061
	Vive en zona rural	7.822	<0.01

Los siguientes gráficos de mosaico muestran la relación de proporciones para las variables discretas analizadas.

Figura 6. Placa dental, cepillado, pasta y mamadera diurna. Se observa que se rechaza la hipótesis de independencia en aquellos niños que están libres de caries y sin caries.

Figura 7. Mamadera diurna, jugo, bebida y control odontológico. Se observa que se rechaza la hipótesis de independencia en aquellos niños que no consumen bebidas azucaradas y están libres de caries.

Figura 8. Control médico, huerta, agua potable, luz. Se observa que se rechaza la hipótesis de independencia en aquellos niños con huerta y sin caries.

Figura 9. Familia mapuche, apoderado mapuche, rural, previsión. Se observa que se rechaza la hipótesis de independencia en aquellos niños con previsión distinta al grupo A y sin caries. Este factor se consideró como proxy de nivel socio-económico.

Figura 10. Idiomas en casa, educación madre, padre y tipo de vivienda. Si bien se observa que se rechaza la independencia entre las variables idioma mapuche y caries, los casos son mínimos como para considerar está independencia.

Aquellos factores con valores de $p < 0.05$ variables pasaron a continuación a un análisis de regresión logística multivariada que asume una dirección o asociación de tipo causal a diferencia del análisis de chi cuadrado que solo verifica independencia de variables. Este paso se realizó para asegurar la potencia estadística del análisis

multivariado, considerando la alta proporción de niños con caries a analizar en comparación a los sin caries.

3.4 Modelo de análisis multivariado

Se generaron modelos estadísticos multivariados utilizando cruzando los datos del examen clínico de prevalencia (n=330) con el cuestionario de riesgo (n=210). Se analizaron solo las variables en las que se rechazó la hipótesis nula de independencia mediante el test de chi cuadrado para mantener la potencia estadística sobre el 80%. Se introdujeron todas las variables y se fueron eliminando aquellas no significativas hasta quedar con el mínimo número de variables dependientes. Se evaluaron examinando el criterio de información Akaike (AIC) que permite evaluar la bondad del ajuste, favoreciendo el modelo con menor residuales, pero penalizando por incluir más variables independientes o explicativas de las necesarias (Pregibon, 1981). A partir del modelo inicial que consideraba todas las variables a excepción de aquellas con menos de 10 sujetos en el grupo riesgo (sin control médico y sin luz eléctrica), se generaron tres modelos manualmente eliminando aquellos factores con valores de significancia >5%. El modelo final mínimo incluye la presencia de placa dental al momento del examen, el consumo de bebidas azucaradas y la ausencia de huerta, según se observa en la Tabla 15.

Tabla 15. Modelo multivariado de regresión logística para factores de riesgo de CTI en la población de Panguipulli.

	Variable dependiente:			
	Presencia de CTI (=1)			
	Estimado (Error estándar)			
	(1)	(2)	(3)	(4)
Sexo (Masculino)	-0.219 (0.355)			
Cepillado no supervisado	0.269 (0.358)			
No uso de pasta dental fluorada	0.384 (0.733)			
Consumo mamadera diurna con azúcar	0.233 (0.542)			
Consumo mamadera nocturna con azúcar	0.026 (0.482)			
No consumo jugos naturales	0.010 (0.444)			
Previsión familiar FONASA A	0.851** (0.376)			
Se habla mapuche en casa	1.513 (1.179)			
Padre con educación básica incompleta	0.726 (0.540)			
Madre con educación básica incompleta	-0.755 (0.516)			
Vive en casa no propia	-0.410 (0.353)			
Placa	0.124 (0.386)***	0.991 (0.335)***	1.007 (0.333)***	0.968 (0.329)***
Bebida azucarada	0.809 (0.381)**	0.859 (0.343)**	0.844 (0.341)**	0.911 (0.335)***
Ausencia de control odontológico	0.329 (0.432)	0.414 (0.363)		
Ausencia de huerta	0.712 (0.409)**	0.830 (0.385)**	0.904 (0.380)**	1.031 (0.369)***
Familia se declara mapuche	0.958 (0.692)	0.455 (0.339)	0.468 (0.338)	
Habita en zona rural	0.350 (0.403)	0.286 (0.342)	0.263 (0.340)	0.335 (0.336)
Constante (intercepto)	-1.515 (0.124)	-1.656*** (0.460)	-1.365*** (0.375)	-1.252*** (0.360)
Observaciones	210	210	210	210
Log Likelihood	-108.695	-118.979	-119.626	-120.589
Akaike Inf. Crit.(AIC)	261.39	251.959	251.252	251.178

Nota: *p<0.1; **p<0.05; *** p<0.01

4 DISCUSIÓN

4.1 Prevalencia, severidad y actividad

El presente estudio encontró una alta prevalencia y severidad de caries temprana de la infancia en los niños examinados en la comuna de Panguipulli el año 2013-14. Estos datos corresponden al primer estudio poblacional de caries temprana de la infancia realizado en la zona y el primero en Chile en reportar tanto caries cavitadas como lesiones no cavitadas. Estudios previos habían evaluado niños que se atendían en el hospital (Zaror Sánchez et al., 2011) lo que explicaría la leve diferencia de prevalencia. Mientras Zaror y col. reportan una prevalencia de caries del 70%, aquí se encontró un 66.4%. Ambas prevalencias corresponden prácticamente al doble en comparación a la reportada por Echeverría y col. (33,72%) Esto se podría explicar considerando que el estudio de Echeverría y col. (2003) fue realizado en Santiago, Chile, mientras que el de Zaror y col. (2011) y el nuestro fueron en zonas rurales del sur de Chile, reportando tanto la prevalencia en niños que acuden a consulta en el hospital (Zaror y col., 2011) como en una comunidad (el presente estudio).

El estudio más reciente de Hoffmeister et al. (2016) reporta una prevalencia de 20.3% IC95%[17.3, 23.2] a los 2 años y 52.7% IC95%[46.8, 58.5] a los 4 años. Los datos del presente estudio muestran una prevalencia mayor para ambos grupos etarios. Esto se

explicaría por las características de ruralidad de la zona investigada en el presente estudio, a diferencia del estudio de Hoffmeister que analizó niños de jardines infantiles de ciudades en las regiones de Bio-Bio a Magallanes.

La severidad encontrada es similar a la reportada en estudios previos (Broadbent y Thomson, 2005; Casamassimo et al., 2009). Esto sugiere que independiente de la localización geográfica, el patrón de daño de la CTI es constante en las distintas poblaciones. En el presente estudio se encontró el patrón característico con un mayor daño en los dientes anterosuperiores y molares, mientras que los dientes anteroinferiores se mantienen con significativamente menos daño. Esta severidad y el hecho que afecte a los dientes anterosuperiores debería permitir la fácil detección por personal no odontológico, como profesores o profesionales de los centros de salud donde acuden los niños. Sin embargo, el umbral de detección habitual, la caries cavitada, es una etapa tardía e irreversible en el proceso de la caries, sólo susceptible de restauración, sin que exista evidencia de la efectividad de esta restauración. Por el contrario, más del 50% de estas restauraciones fracasan debido a caries secundarias, esto caries, lesiones de caries adyacentes a una restauración (Mjor et al., 2002).

Un hallazgo interesante lo representa la Tabla, donde se observa que del total de lesiones detectadas, un 12% están inactivas o detenidas. Estas lesiones detenidas quedan como marca de la actividad pasada de caries, y usualmente se observó que corresponden a superficies que

una vez cavitadas se detenía el avance de la lesión. Esto podría explicarse debido a que al cavitarse un diente pierde su función, lo que podría alterar la función masticatoria del niño. Por otra parte, se notó que muchos de estos niños se percataron de sus lesiones y algunos incluso señalan correctamente a los dulces y golosinas como la causa. Solo hay otro estudio que mide la presencia de caries temprana de la infancia discriminando por la actividad de la lesión (Nishimura et al., 2008), pero lo utiliza a modo de modelo predictivo y no con fines epidemiológicos. La importancia de detectar la actividad de la lesión es que permite discriminar entre quienes requieren de una intervención para corregir la patología actual de quienes deben recibir una intervención como consecuencia de la actividad pasada de caries, por ejemplo, caries cavitadas con lesiones inactivas. El método tradicional de diagnóstico subestima de manera importante la prevalencia de caries. Es así como el índice ceod pasa de 3.1 a 4.1 al incluir lesiones no cavitadas. Estudios disponibles muestran profesores entrenados pueden detectar de manera confiable lesiones iniciales de caries (Hecksher et al., 2010). Sin embargo el detectar es solo el primer paso, pues como se observó, la caries temprana de la infancia tiene asociados factores de riesgo sociales difíciles de modificar mediante intervenciones puramente clínicas.

Los resultados muestran un aumento de la prevalencia de caries de los 2 a los 5 años junto con aumento de la severidad. Esto sugiere que la intervención a los 6 años sería tardía e ineficiente. Por el contrario,

estos resultados sugieren que las intervenciones preventivas deberían comenzar ya a los 2 años de edad del menor por lo menos.

Al plantear la hipótesis se asumió que la CTI representa una expresión dental de un problema social, y por lo tanto al evaluar su prevalencia y severidad en una población diversa socioeconómica, cultural, demográfica y étnicamente se debería observar una prevalencia mayor que la reportada en los estudios previos poblacionales. Los resultados del presente estudio apoyan esta hipótesis. Esto permitiría extrapolar los resultados a la sociedad chilena, que está aumentando su desigualdad socioeconómica, lo que lleva a predecir que una población cada vez más concentrada de niños pobres, o mapuches, o rurales o inmigrantes verá aumentada su prevalencia y severidad de caries temprana de la infancia.

A continuación se discutirán los hallazgos de los factores de riesgo

4.2 Factores de riesgo de CTI en los preescolares de Panguipulli

En el presente estudio se encontró que el mejor modelo explicativo para la presencia de CTI en la población preescolar de Panguipulli corresponde a la presencia de placa dental visible, (biofilm), el consumo de bebidas azucaradas y la falta de huerta en casa.

El hallazgo de la presencia de placa dental asociada a la presencia de CTI era esperable. Las revisiones sistemáticas disponibles lo reportan de manera consistente (Leong et al., 2012; Parisotto et al., 2010). Un estudio de casos y controles en Australia reportó que los niños con

placa dental visible tienen 8 veces más riesgo de CTI que aquellos que no presenten placa dental visible (OR 8.7 IC95%[2.3, 32.9] (Seow et al., 2009). Este resultado es similar al del presente estudio, donde la razón de prevalencia fue de 1.81 IC95%[1.28, 2.5]. Los exámenes fueron realizados en distintos momentos de la mañana durante la asistencia al jardín infantil de los menores. En algunas ocasiones tocó realizar el examen justo luego de un recreo y de manera habitual se observó grandes cantidad de placa correspondiente a restos de alimentos que los niños habían consumido durante el recreo. Aun así, los distintos análisis fueron consistentes en mostrar que es un factor que podría explicar la prevalencia de CTI en esta población.

Se encontró que ni el cepillado inapropiado ni la falta de uso de pasta dental fluorada explican la prevalencia de caries en esta población. Esto contradice los hallazgos de revisiones sistemáticas disponibles (Leong et al., 2012) y sugiere que los quizás la fiabilidad de las respuestas al cuestionario podría ser objetable. Sin embargo, hasta del 2014, las guías de recomendación del MINSAL sugerían no utilizar pasta dental en menores de dos años y utilizar pastas de baja concentración entre 3 a 6 años. El uso de estas pastas dental con baja concentración de flúor ha probado ser inefectivo para el control y prevención de la caries (Uribe et al., 2014). Aun cuando no se encontró una asociación explicativa entre cepillado, pasta dental fluorada y CTI, toda la evidencia disponible enfatiza que los niños en alto riesgo de caries deberían tener acceso dos veces al día cepillado dental con una pasta

dental fluorada supervisado por un adulto (Wong et al., 2011). En el presente estudio no se preguntó por el tipo de pasta dental utilizada, solo si contenía o no flúor.

Por otro lado la evidencia que asocia el consumo de bebidas azucaradas con la caries temprana de la infancia proviene de revisiones sistemáticas (Leong et al., 2012) El presente estudio encontró que este factor permite explicar parte de la prevalencia de la CTI en la población estudiada. El aporte nutricional de las bebidas azucaradas está siendo puesto cada día en duda (Moynihan, 2016) y no hay ninguna recomendación sanitaria que sugiera su uso. Por esto, las políticas de colegios y jardines infantiles saludables deberían entregar la información a los padres acerca del rol de la dieta en la salud oral de sus hijos y pupilos. Mientras el MINSAL está readecuando su estrategia incorporando de manera más decidida el componente educativo y de promoción para la prevención de salud oral, mediante campañas como Chile Crece Contigo y la más reciente Sembrando Sonrisas, los profesores y Ministerio de Educación también tienen un rol que podría influir en mejorar la salud bucal de los preescolares.

El hallazgo más interesante fue el rol de factor de riesgo de la huerta cuando está ausente. La decisión de incluirlo obedecía la evidencia que el consumo de verduras actúa como un factor protector de CTI, con un OR reportado de 0.97 IC95%[0.94, 0.99] (Yen et al., 2010).

Si bien se habían reportado alimentos que ejercen un rol protector contra la caries, como los quesos, leche y frutos secos (Touger-Decker y

van Loveren, 2003), la evidencia acerca del rol de los vegetales es escasa. El estudio de Yen et al. Se hizo en niños entre 3 a 6 años mediante diarios dietéticos. En el presente estudio, debido a que no se tenía certeza de poder recuperar el diario dietético, se optó por evaluar algún proxy de consumo de frutas o verduras. En visitas iniciales se percató que existían numerosas casas con huertas y se decidió incluir este factor.

El diseño utilizado por la presente investigación no permite identificar el mecanismo por el cual la presencia de huerta ejercería su rol protector. Por un lado podría explicarse indicando que la gente que tiene huerta tiene un nivel socioeconómico más bajo que el resto, por lo que su capacidad para adquirir alimentos cariogénicos se ve disminuida. Subanálisis realizados no mostraron diferencias en zona que habitaban (rural, urbana), etnicidad ni sistema de salud. Otra explicación podría ser que hay algo en los alimentos que consumen que ejerce un rol protector. Asimismo, la presencia de huerta podría ser un proxy para una serie de otras actitudes y conductas asociadas a un estilo de vida más saludable. Como sea, aumentar el consumo de frutas y verduras es una de las estrategias del factor de riesgo común, ya que los beneficios abarcan al individuo en su totalidad. Futuras investigaciones longitudinales deberían enfocarse en el rol del consumo de frutas y verduras e incidencia de caries para dilucidar el si actúan como un factor protector per se o como un indicador que permita

identificar poblaciones con hábitos saludables que tienen impacto en la salud oral.

La revisión de la literatura permitió detectar factores de riesgo reportados en distintas poblaciones incluyendo la chilena. Con esto se planteó la hipótesis que estos factores de riesgo se comportarían de una manera similar en la población de Panguipullí. Se encontró que de los 13 factores de riesgo reportados previamente en la literatura, solo tres explicarían la alta prevalencia de caries en la población estudiada. Esto permite aceptar la hipótesis planteada, con el reparo que no todos los factores de riesgo permiten explicar la alta prevalencia de caries en esta población. Esto podría tener consecuencias desde el punto de vista de la salud pública y podría sugerir que no existe un programa preventivo ideal que abarque a todos los niños, sino que distintos grupos requerirían programas diseñados de manera específica. En el caso de la población estudiada, con un alto componente rural y de individuos que reconocen pertenecer a pueblos originarios, el hecho que la ausencia de huerta actúe como factor de riesgo para la CTI sugiere que una intervención comunitaria basada en la entrega de los materiales y capacitación para diseñar y mantener huertas podría tener un efecto significativo en esta población.

4.3 Limitaciones del presente estudio

El análisis de las limitaciones del estudio se puede dividir en dos partes, una para los resultados de prevalencia y la otra para el análisis de riesgo.

En lo que respecta a la prevalencia, las limitaciones del presente estudio se refieren principalmente a la población de origen. Es difícil identificar si esta población es representativa de las realidades rurales de otros países latinoamericanos. Sin embargo, la prevalencia poblacional reportada permite inferir aspectos importantes acerca de posibles decisiones respecto al enfoque del problema de la caries en población preescolar. En Chile, al igual como se ha reportado en otros países (Navas et al., 2006), el principal trabajo de los odontólogos de los centros públicos de salud está enfocado en la restauración más que en la prevención de enfermedades bucales, sin que exista evidencia de la efectividad de un material restaurador para el tratamiento de la caries en la dentición temporal (Uribe, 2010). Sin embargo, el presente estudio tiene la ventaja de incluir lesiones no cavitadas y esto explicaría la alta prevalencia observada y la discrepancia con el valor reportado por Echeverría y col (2003). Estas lesiones, a diferencia de las cavitadas, son susceptibles de un tratamiento no invasivo, como los fluoruros, que han demostrado una alta efectividad clínica, ya sea en aquellas terapias aplicadas profesionalmente, como barnices o en pastas dentales. Asimismo, existe evidencia clínica de la efectividad de programas enfocados al binomio madre-hijo (Gómez et al. 2007) por lo

que los resultados obtenidos, si bien muestran una alta prevalencia y severidad de daño por caries en niños de zonas rurales, sugieren que se deben hacer todos los esfuerzos posibles por implementar estrategias basadas en evidencia científica para disminuir el daño dental en la población preescolar.

Para el análisis de riesgo el presente estudio tiene dos limitaciones importantes. En primer lugar el diseño del estudio no permite establecer de manera robusta causalidad. Un estudio longitudinal de seguimiento permitiría calcular el riesgo relativo de cada uno de los factores involucrados. Es por esto que la manera más correcta de referirse a los hallazgos del presente estudio sería mencionar a las variables asociadas como indicadores más que factores de riesgo. Sin embargo, el modelado estadístico permitió establecer de manera razonablemente consistente la existencia de factores de riesgo que estarían actuando en esta población, confirmando los hallazgos previos de la literatura en cuanto a la presencia de placa dental y consumo de bebidas azucaradas e identificando un nuevo factor que podría ejercer un rol protector, a saber, la presencia de huerta.

La segunda limitación tiene relación con el instrumento de recolección de información. El hecho que sea autodeclarado y las numerosas dificultades que hubo de enfrentar para aplicar el cuestionario a los padres y apoderados de zonas rurales dificulta la realización de esta investigación. Asimismo, el hecho que sea autodeclarado podría incluir un sesgo importante en las respuestas. Si bien en la prueba piloto se

encontró un alto acuerdo en el test-retest, el hecho que algunos de lo apoderados tuvieran formación educacional escasa podría limitar la fiabilidad de los hallazgos.

Luego de hacer la planificación del estudio, resultó que el CENSO utilizado para los supuestos poblacionales contenía errores metodológicos y fue retractado. El presente estudio utilizó los estadísticos poblaciones reportados en ese informe censal. El presente estudio se hace cargo de esa debilidad metodológica y se optó por reportar todos los estadísticos con su intervalo de confianza al 95%. De todas maneras, esto afectaría solamente la estimación de la prevalencia, por cuanto la de los factores de riesgo se hizo sobre la base del número de factores a examinar. A respecto, el error estándar de la media para el índice fue de 0.246 con lo que el error en la estimación sería de un 5.9%, lo que es levemente superior al estándar del 5%. Sin embargo esto no invalida el resultado principal, a saber, que la prevalencia y severidad de caries en esta población es alta y por sobre la media reportada en estudios previos.

Asimismo, la muestra original esperaba ser probabilística. Sin embargo luego de los exámenes iniciales, muchos padres decidieron solicitar que se examinara a sus hijos. Estos pacientes, que deberían haber quedado fuera del análisis fueron finalmente incluidos, con lo que la muestra final correspondió a una serie de casos.

4.4 Fortalezas del presente estudio

Las fortalezas del presente estudio se refieren a los supuestos a priori del tamaño muestral y que la muestra haya sido seleccionada aleatoriamente de entre los voluntarios y no de manera intencional. Estudios previos fueron realizados en muestras por conveniencia (Zaror et al., 2011) o en poblaciones urbanas (Echeverría et al., 2003, Hoffmeister et al., 2016). En el presente estudio el casi la mitad de la muestra es rural, con familia que se declara mapuche o con previsión FONASA tipo A que corresponde a familias de ingreso económico bajo. Una revisión sistemática previa encontró que a pesar de existir publicados numerosos estudios, la mayoría posee defectos de diseño que no permiten que sus resultados sean incluidos en un meta-análisis (Leong et al., 2012). Para corregir esas deficiencias, el presente estudio utiliza el diseño y análisis recomendado para identificar factores de riesgo y se reporta de acuerdo a las directrices de la pauta STROBE, lo que permite que estos resultados puedan ser comparados en el futuro con estudios similares y que cuenta con la información necesaria para asegurar la replicabilidad de los resultados. Asimismo, la estrategia de análisis permitió elegir el modelo con el menor número de variables que explicase la presencia de caries en la población estudiada.

4.5 Interpretación y relevancia de los resultados del presente estudio

Los resultados del presente estudio confirman la naturaleza multifactorial de la CTI con un fuerte componente biológico (placa

dental), conductual (consumo de bebida azucarada) y social (falta de huerta) como factores que explican la prevalencia de la CTI en la población estudiada.

Estos resultados sugieren que el problema de la caries temprana de la infancia debería enfocarse desde varios ámbitos igualmente importantes. Por un lado la educación en higiene oral de los padres que les permitiría mantener aplicar correctas medidas de cepillado y uso de pasta dental para disminuir la presencia de placa dental visible. Asimismo, considerando la alta prevalencia, los profesores podrían jugar un rol más activo en la detección temprana de los signos iniciales de la CTI a objeto de sugerir un control odontológico cuando fuese necesario y así implementar programas preventivos no invasivos en las lesiones de caries no cavitadas. Asimismo, la educación nutricional para limitar el consumo de bebidas azucaradas en la población preescolar de Panguipulli. Finalmente, el más interesante de los hallazgos sugiere que la presencia en el hogar actuaría como un factor protector de la salud bucal de los preescolares. Futuros estudios deberían investigar este posible factor para explorar nuevas estrategias de prevención y control de la CTI en poblaciones de bajo nivel socioeconómico o con población mixta urbano-rural.

5 CONCLUSIONES

La CTI presenta una prevalencia de 66.4% IC95% [61.3, 71.5] en la población estudiada por sobre lo estimado en estudios previos en Chile, con factores de riesgo asociados tanto a determinantes sociales como biológicos, similares a los reportados en la literatura. La evaluación de caries mediante los criterios tradicionales, detectando solo lesiones cavitadas, subestima la prevalencia y severidad. Esto, unido a la evaluación de la actividad de la caries permite identificar aquellos niño que se beneficiarían de una intervención preventiva o mínimamente invasiva, que son más baratas, simples de aplicar y más efectivas que la estrategia basada en posponer el diagnóstico y tratamiento hasta que la lesión de caries se haya cavitado.

El hecho que la presencia de huerta aparezca como un factor protector en los niños de Panguipulli, independiente de si viven en zona rural o de familias que declaran ser mapuches sugiere que existen alternativas de intervención social que, al orientarse a un factor de riesgo común con otras patologías crónicas no transmisibles como la diabetes, obesidad e hipertensión, podrían tener un impacto significativo en mejorar la salud de los niños de la comuna de Panguipulli.

6 BIBLIOGRAFÍA

- AAPD, 2008. Policy on early childhood caries (ECC): classifications, consequences, and preventive strategies. *Pediatr Dent* 30, 40-43.
- AbdelAziz, W.E., Dowidar, K.M.L., El Tantawi, M.M.A., 2015. Association of Healthy Eating, Juice Consumption, and Bacterial Counts with Early Childhood Caries. *Pediatr Dent* 37, 462-467.
- Acharya, S., Tandon, S., 2011. The effect of early childhood caries on the quality of life of children and their parents. *Contemporary clinical dentistry* 2, 98.
- Acs, G., Lodolini, G., Kaminsky, S., Cisneros, G.J., 1992. Effect of nursing caries on body weight in a pediatric population. *Pediatr Dent* 14, 302-305.
- Aguilera, A., Herrera, P., Jamett, J., Cordero, K., Uribe, S., 2005. Perfil de las actividades odontológicas realizadas en población menor de 20 años beneficiaria del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio durante los años 2000 al 2003. *Rev Fac Odonto Valpo* 3, 745-750.
- Ahn, S., Burdine, J.N., Smith, M.L., Ory, M.G., Phillips, C.D., 2011. Residential rurality and oral health disparities: influences of contextual and individual factors. *J Prim Prev* 32, 29-41. doi:10.1007/s10935-011-0233-0.
- Albino, J., Tiwari, T., 2016. Preventing Childhood Caries: A Review of Recent Behavioral Research. *J. Dent. Res.* 95, 35-42. doi:10.1177/0022034515609034.

- Al-Jewair, T.S., Leake, J.L., 2010. The prevalence and risks of early childhood caries (ECC) in Toronto, Canada. *J Contemp Dent Pract* 11, 001-008.
- Alsharif, A.T., Kruger, E., Tennant, M., 2015. Dental hospitalization trends in Western Australian children under the age of 15 years: a decade of population-based study. *Int J Paediatr Dent* 25, 35-42. doi:10.1111/ipd.12095
- Alves Filho, P., Santos, R.V., Vettore, M.V., 2014. [Factors associated with dental caries and periodontal diseases in Latin American indigenous peoples: a systematic review]. *Rev. Panam. Salud Publica* 35, 67-77.
- Angel, P., Fresno, M., Cisternas, P., Lagos, M., Moncada, G., 2010. Prevalencia de caries, pérdida de dientes y necesidad de tratamiento en población adulta Mapuche-Huilliche de Isla Huapi. *Revista clínica de periodoncia, implantología y rehabilitación oral* 3, 69-72. doi:10.4067/S0719-01072010000200002
- Arteaga, Ó., Thollaug, S., Nogueira, A.C., Darras, C., 2002. Information for health equity in Chile. *Revista Panamericana de Salud Pública* 11, 374-385. doi:10.1590/S1020-49892002000500012
- Avila, W.M., Pordeus, I.A., Paiva, S.M., Martins, C.C., 2015. Breast and Bottle Feeding as Risk Factors for Dental Caries: A Systematic Review and Meta-Analysis. *PLoS ONE* 10, e0142922. doi:10.1371/journal.pone.0142922

- Ba, D., S, T., V, S., Bg, L., Lk, B., G, T.-E., Pi, E., Ed, B.-A., Am, H., Ch, L., 2007. Trends in oral health status: United States, 1988-1994 and 1999-2004. *Vital Health Stat* 11 1-92.
- Bader, J.D., Shugars, D.A., Bonito, A.J., 2001. Systematic reviews of selected dental caries diagnostic and management methods. *J Dent Educ* 65, 960-968.
- Ballesteros, S., Teuber, A.M., Stuardo, O., Villarroel, H., 1977. [Comparative environmental-ethnic study on incidence of dental caries in a school population in the south of Chile]. *Odontol Chil* 25, 98-101.
- Bansal, K., Goyal, M., Dhingra, R., 2016. Association of severe early childhood caries with iron deficiency anemia. *J Indian Soc Pedod Prev Dent* 34, 36-42. doi:10.4103/0970-4388.175508
- Barnes, G.P., Parker, W.A., Lyon, T.C., Drum, M.A., Coleman, G.C., 1992. Ethnicity, location, age, and fluoridation factors in baby bottle tooth decay and caries prevalence of Head Start children. *Public Health Rep* 107, 167-173.
- Bastías, G., Pantoja, T., Leisewitz, T., Zárate, V., 2008. Health care reform in Chile. *CMAJ* 179, 1289-1292. doi:10.1503/cmaj.071843
- Beck, J.D., 2007. Risk revisited. *Community dentistry and oral epidemiology* 26, 220-225.
- Benzian, H., Williams, D., 2015. FDI - Oral Health Atlas (2015) [WWW Document]. Oral Health Atlas (2015). URL

- [http://www.fdiworldental.org/publications/oral-health-atlas/oral-health-atlas-\(2015\).aspx](http://www.fdiworldental.org/publications/oral-health-atlas/oral-health-atlas-(2015).aspx) (accessed 12.18.15).
- Bhopal, R., 1997. Is research into ethnicity and health racist, unsound, or important science? *BMJ* 314, 1751-1756.
- BM, 2016. Índice de Gini | Datos | Tabla [WWW Document]. URL <http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI> (accessed 1.25.16).
- Bowen, W.H., Lawrence, R.A., 2005. Comparison of the cariogenicity of cola, honey, cow milk, human milk, and sucrose. *Pediatrics* 116, 921-926. doi:10.1542/peds.2004-2462
- Broadbent, J.M., Thomson, W.M., 2005. For debate: problems with the DMF index pertinent to dental caries data analysis. *Community Dent Oral Epidemiol* 33, 400-409. doi:10.1111/j.1600-0528.2005.00259.x
- Bruerd, B., Jones, C., 1996. Preventing baby bottle tooth decay: eight-year results., Preventing baby bottle tooth decay: eight-year results. *Public Health Rep* 111, 111, 63, 63-65.
- Burt, B.A., 2005. Concepts of risk in dental public health. *Community Dentistry and Oral Epidemiology* 33, 240-247. doi:10.1111/j.1600-0528.2005.00231.x
- Burt, B.A., Pai, S., 2001. Sugar consumption and caries risk: a systematic review. *J Dent Educ* 65, 1017-1023.

- Casamassimo, P.S., Thikkurissy, S., Edelstein, B.L., Maiorini, E., 2009. Beyond the dmft: the human and economic cost of early childhood caries. *J Am Dent Assoc* 140, 650-657.
- Caufield, P.W., Li, Y., Bromage, T.G., 2012. Hypoplasia-associated severe early childhood caries--a proposed definition. *J. Dent. Res.* 91, 544-550. doi:10.1177/0022034512444929
- Chattopadhyay, A., 2011. *Oral Health Epidemiology: Principles and Practice*. Jones & Bartlett Learning.
- Chongsuvivatwong, V., 2012. epicalc: Epidemiological calculator.
- Chou, R., Cantor, A., Zakher, B., Mitchell, J.P., Pappas, M., 2014. Prevention of Dental Caries in Children Younger Than 5 Years Old: Systematic Review to Update the U.S. Preventive Services Task Force Recommendation, U.S. Preventive Services Task Force Evidence Syntheses, formerly Systematic Evidence Reviews. Agency for Healthcare Research and Quality (US), Rockville (MD).
- Chu, C.-H., Ho, P.-L., Lo, E.C.M., 2012. Oral health status and behaviours of preschool children in Hong Kong. *BMC Public Health* 12, 767. doi:10.1186/1471-2458-12-767
- Cleaton-Jones, P., Fatti, P., Bönecker, M., 2006. Dental caries trends in 5- to 6-year-old and 11- to 13-year-old children in three UNICEF designated regions--Sub Saharan Africa, Middle East and North Africa, Latin America and Caribbean: 1970-2004. *Int Dent J* 56, 294-300.

- Congiu, G., Campus, G., Lugliè, P.F., 2014. Early Childhood Caries (ECC) Prevalence and Background Factors: A Review. *Oral Health Prev Dent* 12, 71–76. doi:10.3290/j.ohpd.a31216
- Cornejo-Ovalle, M., Paraje, G., Vásquez-Lavín, F., Pérez, G., Palència, L., Borrell, C., 2015. Changes in Socioeconomic Inequalities in the Use of Dental Care Following Major Healthcare Reform in Chile, 2004–2009. *Int J Environ Res Public Health* 12, 2823–2836. doi:10.3390/ijerph120302823
- Darmawikarta, D., Chen, Y., Carsley, S., Birken, C.S., Parkin, P.C., Schroth, R.J., Maguire, J.L., TARGet Kids! Collaboration, 2014. Factors associated with dental care utilization in early childhood. *Pediatrics* 133, e1594–1600. doi:10.1542/peds.2013-3725
- Davies, G.M., Duxbury, J.T., Boothman, N.J., Davies, R.M., 2007. Challenges associated with the evaluation of a dental health promotion programme in a deprived urban area. *Community Dent Health* 24, 117–121.
- de la Maza, F.J., Cueto, M.V., 1989. [Epidemiological study of oral health in a young adult Mapuche population]. *Odontol Chil* 37, 183–185.
- Deichsel, M., Rojas, G., Lüdecke, K., Heinrich-Weltzien, P.D.R., 2012. Frühkindliche Karies und assoziierte Risikofaktoren bei Kleinkindern im Land Brandenburg. *Bundesgesundheitsbl.* 55, 1504–1511. doi:10.1007/s00103-012-1537-9

- Del Valle, C., MINSAL, 2010. Análisis de situación de salud bucal. [WWW Document]. Protección de salud > Salud Bucal. URL <http://www.minsal.gob.cl/portal/url/item/9c81093d17385cafe04001011e017763.pdf> (accessed 9.26.13).
- Department of Health and Human, Services, 2000. Oral Health in America: A Report of the Surgeon General. National Institute of Dental and Craniofacial Research, National Institutes of Health.
- Deveesschauwer, B., Torgerson, P., Charlier, J., Levecke, B., Praet, N., Roelandt, S., Smit, S., Dorny, P., Berkvens, D., Speybroeck, N., 2015. prevalence: Tools for prevalence assessment studies.
- Devoto, F., Plazzotta, S., Perotto, B., Corona, 1966. Patología dentomaxilar en el hombre de los tuimulos del Delta y Araucanos del S: XIX. Rev Asoc Odont Argent 54, 65-6.
- Devoto, F.C.H., Bordoni, N.E., De Manfredi, C.F., 1968. Dental Caries in Deciduous Teeth of Nineteenth Century Araucanians. Journal of Dental Research 47, 571-574.
- Diez, D.M., Barr, C.D., Çetinkaya-Rundel, M., 2015. OpenIntro statistics. <https://www.openintro.org/>
- Divaris, K., 2015. Predicting Dental Caries Outcomes in Children A “Risky” Concept. Journal of dental research 0022034515620779.

- Do, L.G., Scott, J.A., Thomson, W., Stamm, J.W., Rugg-Gunn, A.J., Levy, S.M., Wong, C., Devenish, G., Ha, D.H., Spencer, A., 2014. Common risk factor approach to address socioeconomic inequality in the oral health of preschool children - a prospective cohort study. *BMC Public Health* 14, 429. doi:10.1186/1471-2458-14-429
- Dogar, F., Kruger, E., Dyson, K., Tennant, M., 2011. Oral health of pre-school children in rural and remote Western Australia. *Rural Remote Health* 11, 1869.
- Dogar, F., Kruger, E., Dyson, K., Tennant, M., 2011. Oral health of pre-school children in rural and remote Western Australia. *Rural Remote Health* 11, 1869.
- Dolado, I., Casañas, P., Nebot, M., Manau, C., 1996. [The prevalence of caries and associated factors in 12-year-old schoolchildren of Barcelona]. *Aten Primaria* 18, 111-115.
- Dos Santos Junior, V.E., de Sousa, R.M.B., Oliveira, M.C., de Caldas Junior, A.F., Rosenblatt, A., 2014. Early childhood caries and its relationship with perinatal, socioeconomic and nutritional risks: a cross-sectional study. *BMC Oral Health* 14, 47. doi:10.1186/1472-6831-14-47
- Douglass, J.M., Tinanoff, N., Tang, J.M., Altman, D.S., 2001. Dental caries patterns and oral health behaviors in Arizona infants and toddlers. *Community Dent Oral Epidemiol* 29, 14-22.
- Drury, T.F., Horowitz, A.M., Ismail, A.I., Maertens, M.P., Rozier, R.G., Selwitz, R.H., 1999. Diagnosing and reporting early childhood caries

- for research purposes. A report of a workshop sponsored by the National Institute of Dental and Craniofacial Research, the Health Resources and Services Administration, and the Health Care Financing Administration. *J Public Health Dent* 59, 192-197.
- Dye, B.A., Hsu, K.-L.C., Afful, J., 2015. Prevalence and Measurement of Dental Caries in Young Children. *Pediatr Dent* 37, 200-216.
- Dye, B.A., Tan, S., Smith, V., Lewis, B.G., Barker, L.K., Thornton-Evans, G., Eke, P.I., Beltrán-Aguilar, E.D., Horowitz, A.M., Li, C.-H., 2007. Trends in oral health status: United States, 1988-1994 and 1999-2004. *Vital Health Stat* 11 1-92.
- Dye, B.A., Vargas, C.M., Lee, J.J., Magder, L., Tinanoff, N., 2011. Assessing the relationship between children's oral health status and that of their mothers. *J Am Dent Assoc* 142, 173-183.
- Echeverria, S., Soto, D., Zillmann, G., 2003. Prevalencia de Caries de Lactancia en Niños de 2 a 4 Años de la Región Metropolitana. Diagnóstico Actualizado. *Rev Dent Chile* 94, 14-8.
- Ekbäck, G., Ordell, S., Unell, L., 2012. Can caries in the primary dentition be used to predict caries in the permanent dentition? An analysis of longitudinal individual data from 3-19 years of age in Sweden. *Eur Arch Paediatr Dent* 13, 308-311.
- Espinoza, I., Thomson, W.M., Gamonal, J., Arteaga, O., 2012. Disparities in aspects of oral-health-related quality of life among Chilean adults. *Community Dentistry and Oral Epidemiology*.

- Evans, C.A., Kleinman, D.V., 2000. The Surgeon General's report on America's oral health: opportunities for the dental profession. *J Am Dent Assoc* 131, 1721-1728.
- Farhat-McHayleh, N., Harfouche, A., Souaid, P., 2009. Techniques for managing behaviour in pediatric dentistry: comparative study of live modelling and tell-show-do based on children's heart rates during treatment. *J Can Dent Assoc* 75, 283.
- Fierro Monti, C., Pérez Flores, M., Brunotto, M., 2014. Simple predictive model for Early Childhood Caries of Chilean children. *Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba* 71, 105-112.
- Filstrup, S.L., Briskie, D., da Fonseca, M., Lawrence, L., Wandera, A., Inglehart, M.R., 2003. Early childhood caries and quality of life: child and parent perspectives. *Pediatr Dent* 25, 431-440.
- Fisher-Owens, S.A., Gansky, S.A., Platt, L.J., Weintraub, J.A., Soobader, M.-J., Bramlett, M.D., Newacheck, P.W., 2007. Influences on children's oral health: a conceptual model. *Pediatrics* 120, e510-520. doi:10.1542/peds.2006-3084
- Fisher-Owens, S.A., Isong, I.A., Soobader, M.-J., Gansky, S.A., Weintraub, J.A., Platt, L.J., Newacheck, P.W., 2012. An examination of racial/ethnic disparities in children's oral health in the United States. *J Public Health Dent*. doi:10.1111/j.1752-7325.2012.00367.x
- Fontana, M., Jackson, R., Eckert, G., Swigonski, N., Chin, J., Zandona, A.F., Ando, M., Stookey, G.K., Downs, S., Zero, D.T., 2011.

- Identification of caries risk factors in toddlers. *J. Dent. Res.* 90, 209–214. doi:10.1177/0022034510385458
- Fox, J., Weisberg, S., 2011. *An R Companion to Applied Regression*, Second. ed. Sage, Thousand Oaks CA.
- Freeman, D.H., Jr, 1987. *Applied Categorical Data Analysis*, 1St Edition edition. ed. CRC Press, New York.
- Gamer, M., Lemon, J., <puspendra.pusp22@gmail.com>, I.F.P.S., 2012. irr: Various Coefficients of Interrater Reliability and Agreement.
- Gao, X., Hsu, C.-Y.S., Loh, T., Hwarng, B., Koh, D., 2014. Role of microbiological factors in predicting early childhood caries. *Pediatr Dent* 36, 348–354.
- Gibson, S., Williams, S., 1999. Dental caries in pre-school children: associations with social class, toothbrushing habit and consumption of sugars and sugar-containing foods. Further analysis of data from the National Diet and Nutrition Survey of children aged 1.5–4.5 years. *Caries Res.* 33, 101–113. doi:16503
- Gomez, S., 2010. *Fluorterapia en Odontología - Fundamentos y Aplicaciones Clínicas*, 4a ed. Santiago de Chile.
- Gomez, S.S., Emilson, C.-G., Weber, A.A., Uribe, S., 2007. Prolonged effect of a mother-child caries preventive program on dental caries in the permanent 1st molars in 9 to 10-year-old children. *Acta Odontol. Scand.* 65, 271–274. doi:10.1080/00016350701586647

- Gomez, S.S., Weber, A.A., 2001. Effectiveness of a caries preventive program in pregnant women and new mothers on their offspring. *Int J Paediatr Dent* 11, 117-122.
- Gomez, S.S., Weber, A.A., Emilson, C.G., 2001. A prospective study of a caries prevention program in pregnant women and their children five and six years of age. *ASDC J Dent Child* 68, 191-195, 152.
- Grolemund, G., Wickham, H., 2011. Dates and Times Made Easy with lubridate. *Journal of Statistical Software* 40, 1-25.
- Guerrieri, A., Gaucher, C., Bonte, E., Lasfargues, J.J., 2012. Minimal intervention dentistry: part 4. Detection and diagnosis of initial caries lesions. *Br Dent J* 213, 551-557. doi:10.1038/sj.bdj.2012.1087
- Hajishengallis, E., Parsaei, Y., Klein, M.I., Koo, H., 2015. Advances in the microbial etiology and pathogenesis of early childhood caries. *Mol Oral Microbiol*. doi:10.1111/omi.12152
- Hallett, K.B., O'Rourke, P.K., 2006. Pattern and severity of early childhood caries. *Community Dent Oral Epidemiol* 34, 25-35. doi:10.1111/j.1600-0528.2006.00246.x
- Han, D.-H., Kim, D.-H., Kim, M.-J., Kim, J.-B., Jung-Choi, K., Bae, K.-H., 2014. Regular dental checkup and snack-soda drink consumption of preschool children are associated with early childhood caries in Korean caregiver/preschool children dyads. *Community Dent Oral Epidemiol* 42, 70-78. doi:10.1111/cdoe.12065

- Harris, R., Nicoll, A.D., Adair, P.M., Pine, C.M., 2004. Risk factors for dental caries in young children: a systematic review of the literature. *Community Dental Health* 21, 71-85.
- Haugejorden, O., Birkeland, J.M., 2002. Evidence for reversal of the caries decline among Norwegian children. *Int J Paediatr Dent* 12, 306-315.
- Haugejorden, O., Birkeland, J.M., 2005. Analysis of the ups and downs of caries experience among Norwegian children aged five years between 1997 and 2003. *Acta Odontol. Scand.* 63, 115-122.
- Hecksher, A.S., Luiz, R.R., Costa, A.J.L., Moraes, N.M., 2010. Reliability analysis of visual examinations carried out by school-teachers and a dental assistant in the detection of dental caries. *Community dental health* 27, 89-93.
- Hefti, A.F., Preshaw, P.M., 2012. Examiner alignment and assessment in clinical periodontal research. *Periodontol.* 2000 59, 41-60. doi:10.1111/j.1600-0757.2011.00436.x
- Hoffmeister, L., Moya, P., Vidal, C., Benadof, D., 2016. Factors associated with early childhood caries in Chile. *Gaceta Sanitaria* 30, 59-62. doi:10.1016/j.gaceta.2015.09.005
- Hollister, M.C., Weintraub, J.A., 1993. The association of oral status with systemic health, quality of life, and economic productivity. *J Dent Educ* 57, 901-912.

- Holloway, P.J., JAMES, P.M., SLACK, G.L., 1962. Dental caries among the inhabitants of Tristan da Cunha. (d). The last count. R Soc Health J 82, 139.
- Hsieh, H.-J., Huang, S.-T., Tsai, C.-C., Hsiao, S.-Y., 2012. Toothbrushing Habits and Risk Indicators of Severe Early Childhood Caries Among Aboriginal Taiwanese. Asia Pac J Public Health. Doi:10.1177/1010539511430721
- INE, 2002. Etnias | Instituto Nacional de Estadísticas | INE 2015 [WWW Document]. URL http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/etnias/etnias.php (accessed 4.14.16).
- INE, 2002. Glosario Censo. INE, 2002.
- Ismail, A.I., Sohn, W., Tellez, M., Amaya, A., Sen, A., Hasson, H., Pitts, N.B., 2007. The International Caries Detection and Assessment System (ICDAS): an integrated system for measuring dental caries. Community Dent Oral Epidemiol 35, 170–178. doi:10.1111/j.1600-0528.2007.00347.x
- Jackson, S.L., Vann, W.F., Kotch, J.B., Pahel, B.T., Lee, J.Y., 2011. Impact of Poor Oral Health on Children's School Attendance and Performance. Am J Public Health 101, 1900–1906. doi:10.2105/AJPH.2010.200915
- Jiang, E.M., Lo, E.C.M., Chu, C.H., Wong, M.C.M., 2014. Prevention of early childhood caries (ECC) through parental toothbrushing training

- and fluoride varnish application: a 24-month randomized controlled trial. *J Dent* 42, 1543–1550. doi:10.1016/j.jdent.2014.10.002
- Jin, B.-H., Ma, D.-S., Moon, H.-S., Paik, D.-I., Hahn, S.-H., Horowitz, A.M., 2003. Early childhood caries: prevalence and risk factors in Seoul, Korea. *J Public Health Dent* 63, 183–188.
- Jordan, A.R., Becker, N., Jöhren, H.-P., Zimmer, S., 2016. Early Childhood Caries and Caries Experience in Permanent Dentition: A 15-year Cohort Study. *Swiss Dent J* 126, 114–119.
- Joshi, S., Jatrana, S., Paradies, Y., Priest, N., 2014. Differences in health behaviours between immigrant and non-immigrant groups: a protocol for a systematic review. *Syst Rev* 3, 61. doi:10.1186/2046-4053-3-61
- Jr, F.E.H., Dupont, with contributions from C., others, many, 2016. Hmisc: Harrell Miscellaneous.
- Kassebaum, N.J., Bernabé, E., Dahiya, M., Bhandari, B., Murray, C.J.L., Marcenes, W., 2015. Global burden of untreated caries: a systematic review and metaregression. *J. Dent. Res.* 94, 650–658. doi:10.1177/0022034515573272
- Kelly, M., Bruerd, B., 1987. The prevalence of baby bottle tooth decay among two native American populations. *J Public Health Dent* 47, 94–97.
- Kelly, M., Bruerd, B., 1987. The prevalence of baby bottle tooth decay among two native American populations. *J Public Health Dent* 47, 94–97.

- Kidd, E. a. M., Fejerskov, O., 2004. What constitutes dental caries? Histopathology of carious enamel and dentin related to the action of cariogenic biofilms. *J. Dent. Res.* 83 Spec No C, C35–38.
- Kim, J.K., Baker, L.A., Seirawan, H., Crimmins, E.M., 2012. Prevalence of oral health problems in U.S. adults, NHANES 1999-2004: exploring differences by age, education, and race/ethnicity. *Spec Care Dentist* 32, 234–241. doi:10.1111/j.1754-4505.2012.00280.x
- Kim, J.K., Baker, L.A., Seirawan, H., Crimmins, E.M., 2012. Prevalence of oral health problems in U.S. adults, NHANES 1999-2004: exploring differences by age, education, and race/ethnicity. *Spec Care Dentist* 32, 234–241. doi:10.1111/j.1754-4505.2012.00280.x
- Kleinbaum, D.G., Kupper, L.L., Morgenstern, H., 1982. *Epidemiologic research: principles and methods*. Wiley, New York.
- Ladrillo, T.E., Hobdell, M.H., Caviness, A.C., 2006. Increasing prevalence of emergency department visits for pediatric dental care, 1997-2001. *J Am Dent Assoc* 137, 379–385.
- Lagerweij, M.D., van Loveren, C., 2015. Declining Caries Trends: Are We Satisfied? *Curr Oral Health Rep* 2, 212–217. doi:10.1007/s40496-015-0064-9
- Last, J., 2001. *Dictionary of epidemiology*, 4th ed. Oxford University Press, New York, NY.
- Leeson, G.W., 2014. Future prospects for longevity. *Post Reprod Health* 20, 11–15. doi:10.1177/1754045314521551

- Leong, P.M., Gussy, M.G., Barrow, S.-Y.L., de Silva-Sanigorski, A., Waters, E., 2012. A systematic review of risk factors during first year of life for early childhood caries. *Int J Paediatr Dent.* doi:10.1111/j.1365-263X.2012.01260.x
- Li, Y., Wang, W., 2002. Predicting caries in permanent teeth from caries in primary teeth: an eight-year cohort study. *J. Dent. Res.* 81, 561-566.
- Llamas, B., Fehren-Schmitz, L., Valverde, G., Soubrier, J., Mallick, S., Rohland, N., Nordenfelt, S., Valdiosera, C., Richards, S.M., Rohrlach, A., Romero, M.I.B., Espinoza, I.F., Cagigao, E.T., Jiménez, L.W., Makowski, K., Reyna, I.S.L., Lory, J.M., Torrez, J.A.B., Rivera, M.A., Burger, R.L., Ceruti, M.C., Reinhard, J., Wells, R.S., Politis, G., Santoro, C.M., Standen, V.G., Smith, C., Reich, D., Ho, S.Y.W., Cooper, A., Haak, W., 2016. Ancient mitochondrial DNA provides high-resolution time scale of the peopling of the Americas. *Science Advances* 2, e1501385. doi:10.1126/sciadv.1501385
- Louis, C.S., 2016. Baby Teeth Deserve Care While They're There. *The New York Times*. <http://j.mp/1YsRzJW>
- Marcenes, W., Kassebaum, N.J., Bernabé, E., Flaxman, A., Naghavi, M., Lopez, A., Murray, C.J.L., 2013. Global Burden of Oral Conditions in 1990-2010 A Systematic Analysis. *J DENT RES* 92, 592-597. doi:10.1177/0022034513490168

- Marino, R.J., Onetto, J.E., 1995. Caries experience in urban and rural Chilean 3-year-olds. *Community Dentistry and Oral Epidemiology* 23, 60-61. doi:10.1111/j.1600-0528.1995.tb00199.x
- Martinez-Mier, E.A., Zandona, A.F., 2013. The impact of gender on caries prevalence and risk assessment. *Dent. Clin. North Am.* 57, 301-315. doi:10.1016/j.cden.2013.01.001
- Masumo, R., Bardsen, A., Mashoto, K., Åstrøm, A.N., 2012. Prevalence and socio-behavioral influence of early childhood caries, ECC, and feeding habits among 6-36 months old children in Uganda and Tanzania. *BMC Oral Health* 12, 24. doi:10.1186/1472-6831-12-24
- Milnes, A.R., 1996. Description and Epidemiology of Nursing Caries. *Journal of Public Health Dentistry* 56, 38-50. doi:10.1111/j.1752-7325.1996.tb02394.x
- Milnes, A.R., Rubin, C.W., Karpa, M., Tate, R., 1993. A retrospective analysis of the costs associated with the treatment of nursing caries in a remote Canadian aboriginal preschool population. *Community Dent Oral Epidemiol* 21, 253-260.
- MINSAL, 2002. Actividades Odontológicas Recuperativas Según Grupo de Edad, por Servicio de Salud y Tipo de Actividad.
- MINSAL, 2009. MINISTERIO DE SALUD. Guía Clínica ATENCION PRIMARIA DEL PREESCOLAR DE 2 A 5 AÑOS.
- MINSAL, 2010. Análisis de Situación de Salud Bucal, Chile.
- MINSAL, 2013. Guía Clínica Salud Oral integral para niños y niñas de 6 años.

- MINSAL, Ceballos, M., Acevedo, C., 2007. Diagnóstico en Salud Bucal de niños de 2 y 4 años que asisten a la educación preescolar en la Región Metropolitana. Chile, 2007. MINSAL.
- MINSAL, Soto, L., Jara, G., 2009. Diagnóstico en Salud Bucal de los niños de 2 y 4 años de edad que asisten a la educación preescolar en la zona norte y centro del país. Chile, 2009. MINSAL.
- Mjör, I.A., Dahl, J.E., Moorhead, J.E., 2002. Placement and replacement of restorations in primary teeth. *Acta Odontol. Scand.* 60, 25-28.
- Mouradian, W.E., Wehr, E., Crall, J.J., 2000. Disparities in children's oral health and access to dental care. *JAMA* 284, 2625-2631.
- Moynihan, P., 2016. Sugars and Dental Caries: Evidence for Setting a Recommended Threshold for Intake. *Adv Nutr* 7, 149-156. doi:10.3945/an.115.009365
- Moynihan, P.J., Kelly, S. a. M., 2014. Effect on caries of restricting sugars intake: systematic review to inform WHO guidelines. *J. Dent. Res.* 93, 8-18. doi:10.1177/0022034513508954
- Narvai, P.C., Frazão, P., Roncalli, A.G., Antunes, J.L.F., 2006. [Dental caries in Brazil: decline, polarization, inequality and social exclusion]. *Rev. Panam. Salud Publica* 19, 385-393.
- Nauto, A., Oñate, T., Rodriguez, C., Uribe, S., 2012. Prevalencia y severidad de caries temprana de la infancia en niños de 2-5 años en Valdivia, 2012. Universidad Austral de Chile, Valdivia.
- Negron, R., Tyrone, R., 2016. Cuidado dental infantil: 11 errores comunes que cometen los padres. BabyCenter.. Accedido 1/3/2016

- Nishimura, M., Oda, T., Kariya, N., Matsumura, S., Shimono, T., 2008. Using a caries activity test to predict caries risk in early childhood. *J Am Dent Assoc* 139, 63-71.
- Njoroge, N.W., Kemoli, A.M., Gatheche, L.W., 2010. Prevalence and pattern of early childhood caries among 3-5 year olds in Kiambaa, Kenya. *East Afr Med J* 87, 134-137.
- Nobile, C.G.A., Fortunato, L., Bianco, A., Pileggi, C., Pavia, M., 2014. Pattern and severity of early childhood caries in Southern Italy: a preschool-based cross-sectional study. *BMC Public Health* 14, 206. doi:10.1186/1471-2458-14-206
- Nunes, A.M., da Silva, A.A., Alves, C.M., Hugo, F.N., Ribeiro, C.C., 2014. Factors underlying the polarization of early childhood caries within a high-risk population. *BMC Public Health* 14, 988. doi:10.1186/1471-2458-14-988
- Núñez, F.L., Sanz, B.J., Mejía, L.G., 2015. [Dental caries and early childhood development: a pilot study]. *Rev Chil Pediatr* 86, 38-42. doi:10.1016/j.rchipe.2015.04.007
- Nunn, M.E., Dietrich, T., Singh, H.K., Henshaw, M.M., Kressin, N.R., 2009. Prevalence of early childhood caries among very young urban Boston children compared with US children. *J Public Health Dent* 69, 156-162. doi:10.1111/j.1752-7325.2008.00116.x
- Nyvad, B., Crielaard, W., Mira, A., Takahashi, N., Beighton, D., 2013. Dental caries from a molecular microbiological perspective. *Caries Res*. 47, 89-102. doi:10.1159/000345367

- Nyvad, B., Fejerskov, O., 1986. Active root surface caries converted into inactive caries as a response to oral hygiene. *Scand J Dent Res* 94, 281-284.
- Nyvad, B., Machiulskiene, V., Baelum, V., 1999. Reliability of a new caries diagnostic system differentiating between active and inactive caries lesions. *Caries Res.* 33, 252-260. doi:16526
- OECD, 2015. OECD Income Distribution Database (IDD): Gini, poverty, income, Methods and Concepts [WWW Document]. URL <http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm> (accessed 1.25.16).
- Oliveira, A.F.B., Chaves, A.M.B., Rosenblatt, A., 2006. The Influence of Enamel Defects on the Development of Early Childhood Caries in a Population with Low Socioeconomic Status: A Longitudinal Study. *Caries Research* 40, 296-302. doi:10.1159/000093188
- OMS, 1997. Encuestas de salud bucodental: métodos básicos. OMS, Ginebra.
- Parisotto, T.M., Steiner-Oliveira, C., De Souza-E-Silva, C.M., Peres, R.C.R., Rodrigues, L.K.A., Nobre-Dos-Santos, M., 2012. Assessment of cavitated and active non-cavitated caries lesions in 3- to 4-year-old preschool children: a field study. *Int J Paediatr Dent* 22, 92-99. doi:10.1111/j.1365-263X.2011.01171.x
- Parisotto, T.M., Steiner-Oliveira, C., Silva, C.M., Rodrigues, L.K., Nobre-dos-Santos, M., 2010. Early childhood caries and mutans streptococci: a systematic review. *Oral Health Prev Dent* 8, 59-70.

- Peressini, S., 2003. Pacifier use and early childhood caries: an evidence-based study of the literature. *J Can Dent Assoc* 69, 16-19.
- Peretz, B., Gluck, G., 2006. Early childhood caries (ECC): a preventive-conservative treatment mode during a 12-month period. *J Clin Pediatr Dent* 30, 191-194.
- Petersen, P.E., 2003. The World Oral Health Report 2003: continuous improvement of oral health in the 21st century--the approach of the WHO Global Oral Health Programme. *Community Dent Oral Epidemiol* 31 Suppl 1, 3-23.
- Petersen, P.E., 2008. World Health Organization global policy for improvement of oral health--World Health Assembly 2007. *Int Dent J* 58, 115-121.
- Petersen, P.E., Bourgeois, D., Ogawa, H., Estupinan-Day, S., Ndiaye, C., 2005. The global burden of oral diseases and risks to oral health. *Bull. World Health Organ.* 83, 661-669. doi:/S0042-96862005000900011
- Pitts, N.B., 2009. How the detection, assessment, diagnosis and monitoring of caries integrate with personalized caries management. *Monogr Oral Sci* 21, 1-14. doi:10.1159/000224208
- Prakash, P., Subramaniam, P., Durgesh, B.H., Konde, S., 2012. Prevalence of early childhood caries and associated risk factors in preschool children of urban Bangalore, India: A cross-sectional study. *Eur J Dent* 6, 141-152.

- Pratt, B., Zion, D., Lwin, K.M., Cheah, P.Y., Nosten, F., Loff, B., 2014. Linking international clinical research with stateless populations to justice in global health. *BMC Med Ethics* 15, 49. doi:10.1186/1472-6939-15-49
- Pregibon, D., 1981. Logistic Regression Diagnostics. *Ann. Statist.* 9, 705-724. doi:10.1214/aos/1176345513
- Priyadarshini, H.R., Hiremath, S.S., Puranik, M., Rudresh, S.M., Nagaratnamma, T., 2011. Prevalence of early childhood caries among preschool children of low socioeconomic status in Bangalore city, India. *J Int Soc Prev Community Dent* 1, 27-30. doi:10.4103/2231-0762.86384
- Psoter, W.J., Pendrys, D.G., Morse, D.E., Zhang, H., Mayne, S.T., 2006. Associations of ethnicity/race and socioeconomic status with early childhood caries patterns. *J Public Health Dent* 66, 23-29.
- Quandt, S.A., Chen, H., Bell, R.A., Anderson, A.M., Savoca, M.R., Kohrman, T., Gilbert, G.H., Arcury, T.A., 2009. Disparities in oral health status between older adults in a multiethnic rural community: the rural nutrition and oral health study. *J Am Geriatr Soc* 57, 1369-1375. doi:10.1111/j.1532-5415.2009.02367.x
- R Core Team, 2013. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
- Ramezani, G.H., Norozi, A., Valael, N., 2003. The prevalence of nursing caries in 18 to 60 months old children in Qazvin. *Journal of Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentistry* 21, 19.

- Reisine, S.T., Psoter, W., 2001. Socioeconomic status and selected behavioral determinants as risk factors for dental caries. *J Dent Educ* 65, 1009-1016.
- Robke, F.J., 2008. Effects of nursing bottle misuse on oral health. Prevalence of caries, tooth malalignments and malocclusions in North-German preschool children. *J Orofac Orthop* 69, 5-19. doi:10.1007/s00056-008-0724-7
- Rojas-Morales, T., Salas, M.E., Zambrano, O., Navas, R., Viera, N., Chaparro, N., 2006. Modificaciones en las UFC de estreptococos mutans, lactobacilos y de la capacidad amortiguadora de la saliva como indicadores de riesgo a la caries dental en niños y adolescentes que reciben quimioterapia: Estudio piloto. *Acta Odontologica Venezolana* 44, 337 - 341.
- Rugg-Gunn, A., 2013. Dental caries: strategies to control this preventable disease. *Acta Med Acad* 42, 117-130. doi:10.5644/ama2006-124.80
- Rugg-Gunn, A.J., Do, L., 2012. Effectiveness of water fluoridation in caries prevention. *Community Dent Oral Epidemiol* 40 Suppl 2, 55-64. doi:10.1111/j.1600-0528.2012.00721.x
- Rusconi, C., 1938. Caries dentales en indígenas prehispanicos de Mendoza. *Rev Odontol (Buenos Aires)* 26, 388-92.

- Sankeshwari, R.M., Ankola, A.V., Tangade, P.S., Hebhal, M.I., 2012. Feeding Habits and Oral Hygiene Practices as Determinants of Early Childhood Caries in 3- to 5-year-old Children of Belgaum City, India. *Oral Health Prev Dent* 10, 283-290.
- Santos, A.P.P. dos, Soviero, V.M., 2002. Caries prevalence and risk factors among children aged 0 to 36 months. *Pesquisa Odontológica Brasileira* 16, 203-208. doi:10.1590/S1517-74912002000300004
- Sapunar Z, J., Bravo J, P., Schneider C, H., Jiménez M, M., 2003. ¿Es la etnia mapuche un factor de riesgo para padecer fractura de fémur proximal en adultos mayores? *Revista médica de Chile* 131. doi:10.4067/S0034-98872003001000006
- Schroth, R.J., Cheba, V., 2007. Determining the prevalence and risk factors for early childhood caries in a community dental health clinic. *Pediatr Dent* 29, 387-396.
- Schroth, R.J., Smith, W.F., 2007. A review of repeat general anesthesia for pediatric dental surgery in Alberta, Canada. *Pediatr Dent* 29, 480-487.
- Schwarz, E., Lo, E.C., Wong, M.C., 1998. Prevention of early childhood caries--results of a fluoride toothpaste demonstration trial on Chinese preschool children after three years. *J Public Health Dent* 58, 12-18.
- Sealy, P.A., Farrell, N., Hoogenboom, A., 2011. Caregiver self-report of children's use of the sippy cup among children 1 to 4 years of age. *J Pediatr Nurs* 26, 200-205. doi:10.1016/j.pedn.2009.11.001

- Séllós, M.C., Soviero, V.M., 2011. Reliability of the Nyvad criteria for caries assessment in primary teeth. *Eur. J. Oral Sci.* 119, 225-231. doi:10.1111/j.1600-0722.2011.00827.x
- Selwitz, R.H., Ismail, A.I., Pitts, N.B., 2007. Dental caries. *Lancet* 369, 51-59. doi:10.1016/S0140-6736(07)60031-2
- Seow, W.K., Clifford, H., Battistutta, D., Morawska, A., Holcombe, T., 2009. Case-control study of early childhood caries in Australia. *Caries Res.* 43, 25-35. doi:10.1159/000189704
- Sheiham, A., James, W.P.T., 2014. A new understanding of the relationship between sugars, dental caries and fluoride use: implications for limits on sugars consumption. *Public Health Nutr* 17, 2176-2184. doi:10.1017/S136898001400113X
- Sheiham, A., James, W.P.T., 2015. Diet and Dental Caries: The Pivotal Role of Free Sugars Reemphasized. *J. Dent. Res.* 94, 1341-1347. doi:10.1177/0022034515590377
- Shiboski, C.H., Gansky, S.A., Ramos-Gomez, F., Ngo, L., Isman, R., Pollick, H.F., 2003. The association of early childhood caries and race/ethnicity among California preschool children. *J Public Health Dent* 63, 38-46.
- Simón-Soro, A., Mira, A., 2015. Solving the etiology of dental caries. *Trends in Microbiology* 23, 76-82. doi:10.1016/j.tim.2014.10.010
- Singh, S., Vijayakumar, N., Priyadarshini, H.R., Shobha, M., 2012. Prevalence of early childhood caries among 3-5 year old pre-

- schoolers in schools of Marathahalli, Bangalore. *Dent Res J (Isfahan)* 9, 710–714.
- Slabsinskiene, E., Milciuviene, S., Narbutaite, J., Vasiliauskiene, I., Andruskeviciene, V., Bendoraitiene, E.A., Saldūnaite, K., 2010. Severe early childhood caries and behavioral risk factors among 3-year-old children in Lithuania. *Medicina (Kaunas)* 46, 135–141.
- Solar O, I., 2010. A conceptual framework for action on the social determinants of health | National Collaborating Centre for Determinants of Health [WWW Document]. URL <http://nccdh.ca/resources/entry/a-conceptual-framework> (accessed 4.14.16).
- Splieth, C.H., Christiansen, J., Foster Page, L.A., 2016. Caries Epidemiology and Community Dentistry: Chances for Future Improvements in Caries Risk Groups. Outcomes of the ORCA Saturday Afternoon Symposium, Greifswald, 2014. Part 1. *Caries Res.* 50, 9–16. doi:10.1159/000442713
- Sundby, A., Petersen, P.E., 2003. Oral health status in relation to ethnicity of children in the Municipality of Copenhagen, Denmark. *International Journal of Paediatric Dentistry* 13, 150–157. doi:10.1046/j.1365-263X.2003.00449.x
- Tang, J.M., Altman, D.S., Robertson, D.C., O’Sullivan, D.M., Douglass, J.M., Tinanoff, N., 1997. Dental caries prevalence and treatment levels in Arizona preschool children. *Public Health Rep* 112, 319–331.

- Templeton, S., 2014. Rotten teeth put 26,000 children in hospital. *The Sunday Times*.
- Tham, R., Bowatte, G., Dharmage, S.C., Tan, D.J., Lau, M.X.Z., Dai, X., Allen, K.J., Lodge, C.J., 2015. Breastfeeding and the risk of dental caries: a systematic review and meta-analysis. *Acta Paediatr*. 104, 62–84. doi:10.1111/apa.13118
- Thitasomakul, S., Thearmontree, A., Piwat, S., Chankanka, O., Pithpornchaiyakul, W., Teanpaisan, R., Madyusoh, S., 2006. A longitudinal study of early childhood caries in 9- to 18-month-old Thai infants. *Community Dent Oral Epidemiol* 34, 429–436. doi:10.1111/j.1600-0528.2006.00292.x
- Thomson, W.M., Mackay, T.D., 2004. Child dental caries patterns described using a combination of area-based and household-based socio-economic status measures. *Community Dent Health* 21, 285–290.
- Touger-Decker, R., van Loveren, C., 2003. Sugars and dental caries. *Am. J. Clin. Nutr.* 78, 881S–892S.
- Tusek, I., Carević, M., Tusek, J., 2012. [The presence of early childhood caries among the members of different ethnic groups of the South Backa District]. *Vojnosanit Pregl* 69, 1046–1051.
- Twetman, S., Dhar, V., 2015. Evidence of Effectiveness of Current Therapies to Prevent and Treat Early Childhood Caries. *Pediatr Dent* 37, 246–253.

- Uribe, S., 2006. Prevention and management of dental decay in the pre-school child. *Evid-based Dent* 7, 4-7. doi:10.1038/sj.ebd.6400385
- Uribe, S., 2010. Which filling material is best in the primary dentition? *Evid Based Dent* 11, 4-5. doi:10.1038/sj.ebd.6400697
- Uribe, S., Gómez, S.S., Ortiz, M.E., 2014. Systematic review on the use of fluoride toothpastes in preschool children. *Medwave* 14, e5773-e5773. doi:10.5867/medwave.2014.5773
- Uribe, S., Maldupa, U., 2014. Worldwide prevalence of early childhood caries: a systematic review. (Systematic review protocol No. CRD42014009578), PROSPERO International prospective register of systematic reviews. University of York, UK.
- Urzua, I., Mendoza, C., Arteaga, O., Rodriguez, R., Guez, G., Cabello, R., Faleiros, S., Carvajal, P., Muñoz, A., Oz, A., Espinoza, I., Aranda, W., Gamonal, J., Urzua, I., Mendoza, C., Arteaga, O., Rodriguez, Guez, G., Cabello, R., Faleiros, S., Carvajal, P., Muñoz, A., Espinoza, I., Aranda, W., Gamonal, J., 2012. Dental Caries Prevalence and Tooth Loss in Chilean Adult Population: First National Dental Examination Survey, Dental Caries Prevalence and Tooth Loss in Chilean Adult Population: First National Dental Examination Survey. *International Journal of Dentistry*, *International Journal of Dentistry* 2012, e810170. Doi:10.1155/2012/810170, 10.1155/2012/810170
- Vadiakas, G., 2008. Case definition, aetiology and risk assessment of early childhood caries (ECC): a revisited review. *Eur Arch Paediatr Dent* 9, 114-125.

- Van den Branden, S., Van den Broucke, S., Leroy, R., Declerck, D., Hoppenbrouwers, K., 2012. Oral health and oral health-related behaviour in preschool children: evidence for a social gradient. *Eur. J. Pediatr.* doi:10.1007/s00431-012-1874-6
- Vargas, C.M., Dye, B.A., Kolasny, C.R., Buckman, D.W., McNeel, T.S., Tinanoff, N., Marshall, T.A., Levy, S.M., 2014. Early childhood caries and intake of 100 percent fruit juice: Data from NHANES, 1999-2004. *J Am Dent Assoc* 145, 1254-1261. doi:10.14219/jada.2014.95
- Vargas, R., Herrera, M., 2002. Estudio de Prevalencia de Caries en Escolares de las Comunidades Rurales Mapuches de Panguinilague, Puquiñe y Lago Neltume. Provincia de Valdivia. X Región de Los Lagos. *Rev Dent Chile* 93, 3-8.
- Vásquez, F., Paraje, G., Estay, M., 2013. Income-related inequality in health and health care utilization in Chile, 2000-2009. *Rev. Panam. Salud Publica* 33, 98-106, 2 p preceding 98.
- Veliz, A.A., 1997. Prevalencia de caries dental en niños mapuches de 8 a 12 años de las escuelas rurales municipales de la comuna de Temuco. Universidad Adventista de Chile, Temuco.
- von Elm, E., Altman, D.G., Egger, M., Pocock, S.J., Gøtzsche, P.C., Vandenbroucke, J.P., 2007. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. *Ann. Intern. Med.* 147, 573-577.

- Warren, J.J., Weber-Gasparoni, K., Marshall, T.A., Drake, D.R., Dehkordi-Vakil, F., Kolker, J.L., Dawson, D.V., 2008. Factors associated with dental caries experience in 1-year-old children. *J Public Health Dent* 68, 70–75. doi:10.1111/j.1752-7325.2007.00068.x
- Watson, M.-R., Horowitz, A.M., Garcia, I., Canto, M.T., 1999. Caries conditions among 2–5-year-old immigrant Latino children related to parents' oral health knowledge, opinions and practices. *Community Dentistry and Oral Epidemiology* 27, 8–15. doi:10.1111/j.1600-0528.1999.tb01986.x
- Watt, R.G., 2007. From victim blaming to upstream action: tackling the social determinants of oral health inequalities. *Community Dent Oral Epidemiol* 35, 1–11. doi:10.1111/j.1600-0528.2007.00348.x
- Watt, R.G., Sheiham, A., 2012. Integrating the common risk factor approach into a social determinants framework. *Community Dent Oral Epidemiol* 40, 289–296. doi:10.1111/j.1600-0528.2012.00680.x
- Wennhall, I., Matsson, L., Schröder, U., Twetman, S., 2002. Caries prevalence in 3-year-old children living in a low socio-economic multicultural urban area in southern Sweden. *Swed Dent J* 26, 167–172.
- Wickham, H., 2007. Reshaping Data with the reshape Package. *Journal of Statistical Software* 21, 1–20.
- Wickham, H., 2009. *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York.

- Wickham, H., 2011. The Split-Apply-Combine Strategy for Data Analysis. *Journal of Statistical Software* 40, 1-29.
- Wickham, H., 2016. tidyr: Easily Tidy Data with `spread()` and `gather()` Functions.
- Wickham, H., Francois, R., 2015. dplyr: A Grammar of Data Manipulation.
- Wolff, D., Frese, C., Maier-Kraus, T., Krueger, T., Wolff, B., 2013. Bacterial biofilm composition in caries and caries-free subjects. *Caries Res.* 47, 69-77. doi:10.1159/000344022
- Wong, M.C.M., Clarkson, J., Glenney, A.-M., Lo, E.C.M., Marinho, V.C.C., Tsang, B.W.K., Walsh, T., Worthington, H.V., 2011. Cochrane reviews on the benefits/risks of fluoride toothpastes. *J. Dent. Res.* 90, 573-579. doi:10.1177/0022034510393346
- Yee, R., Sheiham, A., 2002. The burden of restorative dental treatment for children in Third World countries. *Int Dent J* 52, 1-9.
- Yen, C.-E., Huang, Y.-C., Hu, S.-W., 2010. Relationship between dietary intake and dental caries in preschool children. *Int J Vitam Nutr Res* 80, 205-215. doi:10.1024/0300-9831/a000022
- Yoon, R.K., Smaldone, A.M., Edelstein, B.L., 2012. Early childhood caries screening tools: a comparison of four approaches. *J Am Dent Assoc* 143, 756-763.

- Zaror S, C., Sapunar Z, J., Muñoz N, S., González C, D., 2014. [Association between overweight and early childhood caries]. *Rev Chil Pediatr* 85, 455-461. doi:10.4067/S0370-41062014000400008
- Zaror Sánchez, C., Pineda Toledo, P., Orellana Cáceres, J.J., 2011. Prevalencia de Caries Temprana de la Infancia y sus Factores Asociados en Niños Chilenos de 2 y 4 Años. *International journal of odontostomatology* 5, 171-177. doi:10.4067/S0718-381X2011000200010
- Zhang, X., Yang, S., Liao, Z., Xu, L., Li, C., Zeng, H., Song, J., Zhang, L., 2016. Prevalence and care index of early childhood caries in mainland China: evidence from epidemiological surveys during 1987-2013. *Sci Rep* 6, 18897. doi:10.1038/srep18897

7. ANEXOS

7.1 Análisis estadísticos

Descriptivo

```
> # Demografía, edad y género -----
```

```
> edadygenero <- table(prevalencia$edad, prevalencia$género)
```

```
> edadygenero
```

	Femenino	Masculino
2	5	3
3	16	14
4	84	50
5	73	85

```
> ddply(prevalencia, ~género, summarise, mean=mean(edad), sd=sd(edad))
```

	género	mean	sd
1	Femenino	4.264045	0.7387189
2	Masculino	4.427632	0.7423069

```
> ddply(prevalencia, ~caso.o.control, summarise, mean=mean(edad), sd=sd(edad))
```

	caso.o.control	mean	sd
1	Sano	4.315315	0.7383271

```
2      Con CTI 4.351598 0.7478622> table(prevalencia$edad, prevalencia$género) # tabla
prevalencia género
```

	Femenino	Masculino
2	5	3
3	16	14
4	84	50
5	73	85

```
> # tiene más caries los mapuches?
```

```
> # prevalencia
```

```
> table(df$grupo.familiar.se.reconoce.mapuche, df$caso.o.control)
```

```

Control Caso
noriesgo    52  58
riesgo      27  73
> chisq.test(table(df$grupo.familiar.se.reconoce.mapuche, df$caso.o.control))

```

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

```

data: table(df$grupo.familiar.se.reconoce.mapuche, df$caso.o.control)
X-squared = 8.33, df = 1, p-value = 0.003

```

1 PREVALENCIA Y SEVERIDAD -----

```
## Puntual
```

```

n          <- length(prevalencia$caso.o.control); n  # casos y controles válidos
k          <- sum(prevalencia$caso.o.control == "Con CTI") ; k
prevalenciapuntual  <- k/n; prevalenciapuntual*100 # prevalencia = 66.4%

```

```
## Intervalo de la estimación de la prevalencia
```

```

SE  <- sqrt(prevalenciapuntual * (1 - prevalenciapuntual) / n); SE  # error standard = 0.026
E   <- qnorm(.975)*SE; E      # margen of error = 0.05097541 en porcentaje
IC  <- prevalenciapuntual + c(-E, E) ; IC # 0.6126610 0.7146118

```

```

# RESULTADO PREVALENCIA 66.36 IC95% (61.26610 71.46118) con un margen de error de
5.097541

```

```
## Prevalencia puntual y estimación para hombres y mujeres
```

```
### prevalencia para hombres
```

```

nh      <- sum(prevalencia$género == "Masculino") ; nh # 152
kh      <- sum(prevalencia$caso.o.control == "Con CTI" & prevalencia$género ==
"Masculino") ; kh # 108
prevalenciapuntualh <- kh/nh; prevalenciapuntualh # 71.05%

SEh     <- sqrt(prevalenciapuntualh * (1 - prevalenciapuntualh) / nh); SEh # 0.03678518
Eh      <- qnorm(.975)*SEh; Eh      # 0.07209762
ICh     <- prevalenciapuntualh + c(-Eh, Eh) ; ICh # 0.6384287 0.7826239

### prevalencia puntual para mujeres
nm      <- sum(prevalencia$género == "Femenino") ; nm # 178
km      <- sum(prevalencia$caso.o.control == "Con CTI" & prevalencia$género ==
"Femenino") ; km # 111
prevalenciapuntualm <- km/nm; prevalenciapuntualm # 62.36%

SEm     <- sqrt(prevalenciapuntualm * (1 - prevalenciapuntualm) / nm); SEm # 0.03631357
Em      <- qnorm(.975)*SEm; Em      # 0.07117328
ICm     <- prevalenciapuntualm + c(-Em, Em) ; ICm # 0.5524222 0.6947688

```

Otra manera de calcular la prevalencia:

1-sample proportions test with continuity correction

data: k out of n, null probability 0.5

X-squared = 34.694, df = 1, p-value = 3.858e-09

alternative hypothesis: true p is not equal to 0.5

95 percent confidence interval:

0.6094841 0.7139115

sample estimates:

p
0.6636364

```
> datosprevalenciamuestrah      <- prop.test(kh, nh); datosprevalenciamuestrah # para los
hombres
```

1-sample proportions test with continuity correction

data: kh out of nh, null probability 0.5

X-squared = 26.112, df = 1, p-value = 3.222e-07

alternative hypothesis: true p is not equal to 0.5

95 percent confidence interval:

0.6305051 0.7797022

sample estimates:

p
0.7105263

```
> datosprevalenciamuestram      <- prop.test(km, nm) ; datosprevalenciamuestram # para las
mujeres
```

1-sample proportions test with continuity correction

data: km out of nm, null probability 0.5

X-squared = 10.388, df = 1, p-value = 0.001269

alternative hypothesis: true p is not equal to 0.5

95 percent confidence interval:

0.5476683 0.6940969

sample estimates:

p

0.6235955

Comparación entre H/M

```
> table(prevalencia$caso.o.control, prevalencia$género, prevalencia$edad)
```

```
, , = 2
```

	Femenino	Masculino
Sano	1	2
Con CTI	4	1

```
, , = 3
```

	Femenino	Masculino
Sano	2	7
Con CTI	14	7

```
, , = 4
```

	Femenino	Masculino
Sano	37	12
Con CTI	47	38

, , = 5

	Femenino	Masculino
Sano	27	23
Con CTI	46	62

```
> comparacionctihombresmujeres <- table(prevalencia$género, prevalencia$caso.o.control)
> addmargins(comparacionctihombresmujeres)
```

	Sano	Con CTI	Sum
Femenino	67	111	178
Masculino	44	108	152
Sum	111	219	330

```
> chisq.test(comparacionctihombresmujeres) # no hay diferencias sig entre hombres y mujeres
```

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

data: comparacionctihombresmujeres

X-squared = 2.3998, df = 1, p-value = 0.1213

Edad

> comparacionctiedad

Sano Con CTI

2	3	5
3	9	21
4	49	85
5	50	108

> chisq.test(comparacionctiedad) # si hay diferencias

Pearson's Chi-squared test

data: comparacionctiedad

X-squared = 1.0274, df = 3, p-value = 0.7946

Estado de caries por diente

```
> table(diente, estado)
```

estado

```

diente  Sano c1 c3 o p
dte_5.1 224 32 66 2 6
dte_5.2 256 26 45 2 1
dte_5.3 287 24 16 3 0
dte_5.4 233 15 64 15 3
dte_5.5 235 21 52 21 1
dte_6.1 223 31 67 7 2
dte_6.2 269 19 39 2 1
dte_6.3 293 19 18 0 0
dte_6.4 235 13 62 17 3
dte_6.5 229 21 58 20 2
dte_7.1 325 1 2 1 1
dte_7.2 325 4 0 0 1
dte_7.3 322 5 3 0 0
dte_7.4 214 6 75 35 0
dte_7.5 216 18 57 32 7
dte_8.1 326 0 1 1 2
dte_8.2 325 2 0 0 3
dte_8.3 317 8 5 0 0
dte_8.4 210 15 71 31 3
dte_8.5 196 21 69 37 7
> summary(estado)
Sano c1 c3 o p
5260 301 770 226 43

```

Cálculo del copd por edad

```
> copdedad <- table(dientes$estado, dientes$edad)
```

```
> copdedad
```

```
      2  3  4  5
Sano 135 483 2219 2423
c1    9  23 133 136
c3   12  70 258 430
o     2  17  67 140
p     2   7   3  31
```

Bivariado

Gráficos de mosaico

Mamadera nocturna con liq. distinto a agua

Consumo jugo natural (no comercial)

Bebida azucarada

Asistencia a control odontológico

Análisis independencia de las variables

para cada una es `chisq.test( table(casocontrol ,FACTOR DE RIESGO))`. Se eliminará `table(casocontrol` ,

`chisq.test(placa))` # X-squared = 9.9175, df = 1, p-value = 0.001637

`chisq.test(cepillado))` # X-squared = 2.1206, df = 1, p-value = 0.1453))

`chisq.test(pasta))` # X-squared = 4.4029e-30, df = 1, p-value = 1

`chisq.test(mamaderadia))` # X-squared = 0.26064, df = 1, p-value = 0.6097

`chisq.test(mamaderanoche))` # X-squared = 1.5671, df = 1, p-value = 0.2106

`chisq.test(jugo))` # X-squared = 8.741e-31, df = 1, p-value = 1

```

chisq.test(bebida)) # X-squared = 8.0404, df = 1, p-value = 0.004575
chisq.test(      table(controlodg)) # X-squared = 3.4649, df = 1, p-value = 0.06268
chisq.test(      table(controlmed)) # X-squared = 0.14182, df = 1, p-value = 0.7065
chisq.test(      table(huerta)) # X-squared = 14.343, df = 1, p-value = 0.0001524
chisq.test(      table(aguapotable)) # X-squared = 8.4649, df = 1, p-value = 0.003621
chisq.test(      table(luz)) # X-squared = 3.8602, df = 1, p-value = 0.04944
chisq.test(      table(mapuchefamilia)) # X-squared = 10.157, df = 1, p-value = 0.001438
chisq.test(      table(mapucheapoderado)) # X-squared = 7.5801, df = 1, p-value = 0.005902
chisq.test(      table(rural      )) # X-squared = 6.6832, df = 1, p-value = 0.009733
chisq.test(      table(prevision)) # X-squared = 12.626, df = 1, p-value = 0.0003804
chisq.test(      table(idiomasencasa)) # X-squared = 7.3549, df = 1, p-value = 0.006688
chisq.test(      table(educacionmadre)) # X-squared = 5.8476, df = 1, p-value = 0.0156
chisq.test(      table(educacionpadre)) # X-squared = 0.1523, df = 1, p-value = 0.6963
chisq.test(      table(tipovivienda)) # X-squared = 0.27971, df = 1, p-value = 0.5969

```

Estimación de Razones de prevalencia

	Outcome +	Outcome -	Total	Prevalence *
Exposed +	39	30	69	56.5
Exposed -	40	101	141	28.4
Total	79	131	210	37.6
Odds				
Exposed +	1.300			
Exposed -	0.396			
Total	0.603			

Point estimates and 95 % CIs:

Prevalence ratio	1.99 (1.43, 2.78)
Odds ratio	3.28 (1.80, 5.98)
Attrib prevalence *	28.15 (14.29, 42.02)
Attrib prevalence in population *	9.25 (-0.66, 19.16)
Attrib fraction in exposed (%)	49.81 (29.90, 64.06)
Attrib fraction in population (%)	24.59 (10.47, 36.48)

X2 test statistic: 15.647 p-value: < 0.001

Wald confidence limits

* Outcomes per 100 population units

	Outcome +	Outcome -	Total	Prevalence *
Exposed +	35	46	81	43.2
Exposed -	44	85	129	34.1
Total	79	131	210	37.6
Odds				
Exposed +	0.761			
Exposed -	0.518			
Total	0.603			

Point estimates and 95 % CIs:

Prevalence ratio	1.27 (0.90, 1.79)
Odds ratio	1.47 (0.83, 2.60)
Attrib prevalence *	9.10 (-4.44, 22.64)
Attrib prevalence in population *	3.51 (-6.97, 13.99)
Attrib fraction in exposed (%)	21.06 (-11.59, 44.16)

Attrib fraction in population (%) 9.33 (-5.79, 22.29)

X2 test statistic: 1.756 p-value: 0.185

Wald confidence limits

* Outcomes per 100 population units

	Outcome +	Outcome -	Total	Prevalence *
Exposed +	5	7	12	41.7
Exposed -	74	124	198	37.4
Total	79	131	210	37.6

Odds

Exposed +	0.714
Exposed -	0.597
Total	0.603

Point estimates and 95 % CIs:

Prevalence ratio	1.11 (0.56, 2.23)
Odds ratio	1.20 (0.37, 3.91)
Attrib prevalence *	4.29 (-24.40, 32.99)
Attrib prevalence in population *	0.25 (-9.15, 9.64)
Attrib fraction in exposed (%)	10.30 (-79.42, 55.16)
Attrib fraction in population (%)	0.65 (-3.82, 4.93)

X2 test statistic: 0.089 p-value: 0.766

Wald confidence limits

* Outcomes per 100 population units

	Outcome +	Outcome -	Total	Prevalence *
--	-----------	-----------	-------	--------------

Exposed +	63	110	173	36.4
Exposed -	16	21	37	43.2
Total	79	131	210	37.6

Odds

Exposed +	0.573
Exposed -	0.762
Total	0.603

Point estimates and 95 % CIs:

Prevalence ratio	0.84 (0.55, 1.28)
Odds ratio	0.75 (0.37, 1.54)
Attrib prevalence *	-6.83 (-24.33, 10.67)
Attrib prevalence in population *	-5.62 (-22.88, 11.63)
Attrib fraction in exposed (%)	-18.75 (-80.44, 21.85)
Attrib fraction in population (%)	-14.95 (-60.50, 17.67)

X2 test statistic: 0.605 p-value: 0.437

Wald confidence limits

* Outcomes per 100 population units

	Outcome +	Outcome -	Total	Prevalence *
Exposed +	60	103	163	36.8
Exposed -	19	28	47	40.4
Total	79	131	210	37.6

Odds

Exposed +	0.583
Exposed -	0.679

Total 0.603

Point estimates and 95 % CIs:

```
-----
Prevalence ratio          0.91 (0.61, 1.36)
Odds ratio                0.86 (0.44, 1.67)
Attrib prevalence *       -3.62 (-19.48, 12.25)
Attrib prevalence in population * -2.81 (-18.29, 12.68)
Attrib fraction in exposed (%) -9.82 (-64.02, 26.47)
Attrib fraction in population (%) -7.46 (-45.74, 20.77)
-----
```

X2 test statistic: 0.203 p-value: 0.652

Wald confidence limits

* Outcomes per 100 population units

	Outcome +	Outcome -	Total	Prevalence *
Exposed +	15	26	41	36.6
Exposed -	64	105	169	37.9
Total	79	131	210	37.6

	Odds
Exposed +	0.577
Exposed -	0.610
Total	0.603

Point estimates and 95 % CIs:

```
-----
Prevalence ratio          0.97 (0.62, 1.51)
Odds ratio                0.95 (0.47, 1.92)
```

Attrib prevalence *	-1.28 (-17.74, 15.17)
Attrib prevalence in population *	-0.25 (-10.07, 9.57)
Attrib fraction in exposed (%)	-3.51 (-61.83, 33.79)
Attrib fraction in population (%)	-0.67 (-9.58, 7.52)

X2 test statistic: 0.023 p-value: 0.879

Wald confidence limits

* Outcomes per 100 population units

	Outcome +	Outcome -	Total	Prevalence *
Exposed +	35	28	63	55.6
Exposed -	44	103	147	29.9
Total	79	131	210	37.6

Odds

Exposed +	1.250
Exposed -	0.427
Total	0.603

Point estimates and 95 % CIs:

Prevalence ratio	1.86 (1.33, 2.59)
Odds ratio	2.93 (1.59, 5.38)
Attrib prevalence *	25.62 (11.29, 39.95)
Attrib prevalence in population *	7.69 (-2.20, 17.57)
Attrib fraction in exposed (%)	46.12 (24.94, 61.33)
Attrib fraction in population (%)	20.43 (7.29, 31.71)

X2 test statistic: 12.338 p-value: < 0.001

Wald confidence limits

* Outcomes per 100 population units

	Outcome +	Outcome -	Total	Prevalence *
Exposed +	25	27	52	48.1
Exposed -	54	104	158	34.2
Total	79	131	210	37.6
Odds				
Exposed +	0.926			
Exposed -	0.519			
Total	0.603			

Point estimates and 95 % CIs:

Prevalence ratio	1.41 (0.99, 2.01)
Odds ratio	1.78 (0.94, 3.37)
Attrib prevalence *	13.90 (-1.56, 29.36)
Attrib prevalence in population *	3.44 (-6.44, 13.32)
Attrib fraction in exposed (%)	28.91 (-1.47, 50.20)
Attrib fraction in population (%)	9.15 (-1.89, 18.99)

X2 test statistic: 3.221 p-value: 0.073

Wald confidence limits

* Outcomes per 100 population units

	Outcome +	Outcome -	Total	Prevalence *
Exposed +	2	1	3	66.7
Exposed -	77	130	207	37.2
Total	79	131	210	37.6

	Odds
Exposed +	2.000
Exposed -	0.592
Total	0.603

Point estimates and 95 % CIs:

Prevalence ratio	1.79 (0.79, 4.07)
Odds ratio	3.38 (0.30, 37.86)
Attrib prevalence *	29.47 (-24.28, 83.22)
Attrib prevalence in population *	0.42 (-8.87, 9.71)
Attrib fraction in exposed (%)	44.20 (-26.62, 75.41)
Attrib fraction in population (%)	1.12 (-1.31, 3.49)

X2 test statistic: 1.094 p-value: 0.296

Wald confidence limits

* Outcomes per 100 population units

	Outcome +	Outcome -	Total	Prevalence *
Exposed +	63	71	134	47.0
Exposed -	16	60	76	21.1
Total	79	131	210	37.6

	Odds
Exposed +	0.887
Exposed -	0.267
Total	0.603

Point estimates and 95 % CIs:

Prevalence ratio	2.23 (1.39, 3.58)
Odds ratio	3.33 (1.74, 6.36)
Attrib prevalence *	25.96 (13.50, 38.43)
Attrib prevalence in population *	16.57 (5.30, 27.83)
Attrib fraction in exposed (%)	55.22 (28.28, 72.04)
Attrib fraction in population (%)	44.04 (18.31, 61.66)

X2 test statistic: 13.929 p-value: < 0.001

Wald confidence limits

* Outcomes per 100 population units

	Outcome +	Outcome -	Total	Prevalence *
Exposed +	8	34	42	19.0
Exposed -	71	97	168	42.3
Total	79	131	210	37.6
Odds				
Exposed +	0.235			
Exposed -	0.732			
Total	0.603			

Point estimates and 95 % CIs:

Prevalence ratio	0.45 (0.24, 0.86)
Odds ratio	0.32 (0.14, 0.74)
Attrib prevalence *	-23.21 (-37.24, -9.18)
Attrib prevalence in population *	-4.64 (-14.58, 5.29)
Attrib fraction in exposed (%)	-121.88 (-324.18, -16.06)

Attrib fraction in population (%) -12.34 (-20.93, -4.37)

X2 test statistic: 7.716 p-value: 0.005

Wald confidence limits

* Outcomes per 100 population units

	Outcome +	Outcome -	Total	Prevalence *
Exposed +	0.5	8.5	9	5.56
Exposed -	79.5	123.5	203	39.16
Total	80.0	132.0	212	37.74

Odds

Exposed +	0.0588
Exposed -	0.6437
Total	0.6061

Point estimates and 95 % CIs:

Prevalence ratio	0.00 (0.00, NaN)
Odds ratio	0.00 (0.00, NaN)
Attrib prevalence *	-39.11 (-45.84, -32.38)
Attrib prevalence in population *	-1.43 (-10.79, 7.94)
Attrib fraction in exposed (%)	-Inf (-Inf, NaN)
Attrib fraction in population (%)	-3.78 (-6.89, -0.77)

X2 test statistic: 4.143 p-value: 0.042

Wald confidence limits

* Outcomes per 100 population units

	Outcome +	Outcome -	Total	Prevalence *
--	-----------	-----------	-------	--------------

Exposed +	52	58	110	47.3
Exposed -	27	73	100	27.0
Total	79	131	210	37.6

Odds

Exposed +	0.897
Exposed -	0.370
Total	0.603

Point estimates and 95 % CIs:

Prevalence ratio	1.75 (1.20, 2.55)
Odds ratio	2.42 (1.36, 4.32)
Attrib prevalence *	20.27 (7.51, 33.03)
Attrib prevalence in population *	10.62 (-0.27, 21.51)
Attrib fraction in exposed (%)	42.88 (16.66, 60.86)
Attrib fraction in population (%)	28.23 (7.71, 44.18)

X2 test statistic: 9.174 p-value: 0.002

Wald confidence limits

* Outcomes per 100 population units

	Outcome +	Outcome -	Total	Prevalence *
Exposed +	56	70	126	44.4
Exposed -	23	61	84	27.4
Total	79	131	210	37.6

Odds

Exposed +	0.800
Exposed -	0.377

Total 0.603

Point estimates and 95 % CIs:

```
-----
Prevalence ratio          1.62 (1.09, 2.42)
Odds ratio                2.12 (1.17, 3.84)
Attrib prevalence *       17.06 (4.17, 29.96)
Attrib prevalence in population * 10.24 (-1.33, 21.81)
Attrib fraction in exposed (%) 38.39 (8.16, 58.67)
Attrib fraction in population (%) 27.22 (3.25, 45.24)
-----
```

X2 test statistic: 6.253 p-value: 0.012

Wald confidence limits

* Outcomes per 100 population units

	Outcome +	Outcome -	Total	Prevalence *
Exposed +	45	46	91	49.5
Exposed -	34	85	119	28.6
Total	79	131	210	37.6

	Odds
Exposed +	0.978
Exposed -	0.400
Total	0.603

Point estimates and 95 % CIs:

```
-----
Prevalence ratio          1.73 (1.22, 2.46)
Odds ratio                2.45 (1.38, 4.33)
```

Attrib prevalence *	20.88 (7.79, 33.97)
Attrib prevalence in population *	9.05 (-1.38, 19.48)
Attrib fraction in exposed (%)	42.22 (17.85, 59.36)
Attrib fraction in population (%)	24.05 (6.87, 38.06)

X2 test statistic: 9.579 p-value: 0.002

Wald confidence limits

* Outcomes per 100 population units

	Outcome +	Outcome -	Total	Prevalence *
Exposed +	32	87	119	26.9
Exposed -	47	44	91	51.6
Total	79	131	210	37.6

Odds

Exposed +	0.368
Exposed -	1.068
Total	0.603

Point estimates and 95 % CIs:

Prevalence ratio	0.52 (0.36, 0.74)
Odds ratio	0.34 (0.19, 0.61)
Attrib prevalence *	-24.76 (-37.75, -11.76)
Attrib prevalence in population *	-14.03 (-26.21, -1.85)
Attrib fraction in exposed (%)	-92.07 (-174.41, -34.43)
Attrib fraction in population (%)	-37.29 (-59.69, -18.04)

X2 test statistic: 13.469 p-value: < 0.001

Wald confidence limits

* Outcomes per 100 population units

	Outcome +	Outcome -	Total	Prevalence *
Exposed +	78	114	192	40.62
Exposed -	1	17	18	5.56
Total	79	131	210	37.62

Odds

Exposed +	0.6842
Exposed -	0.0588
Total	0.6031

Point estimates and 95 % CIs:

Prevalence ratio	7.31 (1.08, 49.50)
Odds ratio	11.63 (1.52, 89.21)
Attrib prevalence *	35.07 (22.41, 47.73)
Attrib prevalence in population *	32.06 (19.62, 44.51)
Attrib fraction in exposed (%)	86.32 (7.43, 97.98)
Attrib fraction in population (%)	85.23 (2.39, 97.77)

X2 test statistic: 8.625 p-value: 0.003

Wald confidence limits

* Outcomes per 100 population units

	Outcome +	Outcome -	Total	Prevalence *
Exposed +	8	36	44	18.2
Exposed -	71	95	166	42.8
Total	79	131	210	37.6

	Odds
Exposed +	0.222
Exposed -	0.747
Total	0.603

Point estimates and 95 % CIs:

Prevalence ratio	0.43 (0.22, 0.82)
Odds ratio	0.30 (0.13, 0.68)
Attrib prevalence *	-24.59 (-38.25, -10.93)
Attrib prevalence in population *	-5.15 (-15.13, 4.83)
Attrib fraction in exposed (%)	-135.24 (-351.08, -22.68)
Attrib fraction in population (%)	-13.70 (-22.56, -5.47)

X2 test statistic: 8.961 p-value: 0.003

Wald confidence limits

* Outcomes per 100 population units

	Outcome +	Outcome -	Total	Prevalence *
Exposed +	10	25	35	28.6
Exposed -	69	106	175	39.4
Total	79	131	210	37.6

	Odds
Exposed +	0.400
Exposed -	0.651
Total	0.603

Point estimates and 95 % CIs:

Prevalence ratio	0.72 (0.42, 1.26)
Odds ratio	0.61 (0.28, 1.36)
Attrib prevalence *	-10.86 (-27.48, 5.77)
Attrib prevalence in population *	-1.81 (-11.57, 7.96)
Attrib fraction in exposed (%)	-38.00 (-140.41, 20.78)
Attrib fraction in population (%)	-4.81 (-12.61, 2.45)

X2 test statistic: 1.465 p-value: 0.226

Wald confidence limits

* Outcomes per 100 population units

	Outcome +	Outcome -	Total	Prevalence *
Exposed +	41	71	112	36.6
Exposed -	38	60	98	38.8
Total	79	131	210	37.6
Odds				
Exposed +	0.577			
Exposed -	0.633			
Total	0.603			

Point estimates and 95 % CIs:

Prevalence ratio	0.94 (0.67, 1.34)
Odds ratio	0.91 (0.52, 1.60)
Attrib prevalence *	-2.17 (-15.31, 10.97)
Attrib prevalence in population *	-1.16 (-12.82, 10.50)
Attrib fraction in exposed (%)	-5.92 (-50.05, 25.23)

Attrib fraction in population (%) -3.07 (-23.50, 13.97)

X2 test statistic: 0.105 p-value: 0.746

Wald confidence limits

* Outcomes per 100 population units

Mantel-Haenszel chi-squared test with continuity correction

data: df\$huerta.con.alimentos.en.casa. and df\$vive.en.campo. and
df\$caso.o.control

Mantel-Haenszel X-squared = 23.127, df = 1, p-value = 1.516e-06

alternative hypothesis: true common odds ratio is not equal to 1

95 percent confidence interval:

2.656244 10.447966

sample estimates:

common odds ratio

5.26805

Multivariado

Con todos los factores

Call:

```
glm(formula = casocontrol ~ aguapotable + bebida + cepillado +
  controlmed + controlodg + educacionmadre + educacionpadre +
  huerta + idiomasencasa + jugo + luz + mamaderadia + mamaderanoche +
  mapucheapoderado + mapuchefamilia + pasta + placa + prevision +
  rural + tipovivienda, family = "binomial", data = df)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.5476	-0.8996	0.4473	0.8250	2.2824

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	15.30458	1742.96146	0.009	0.99299
aguapotablenoriesgo	0.34948	0.63550	0.550	0.58237
bebidariesgo	0.73183	0.38448	1.903	0.05699 .
cepilladonoriesgo	0.26092	0.35367	0.738	0.46066
controlmednoriesgo	16.21252	1672.41162	0.010	0.99227
controlodgnoriesgo	0.31985	0.41401	0.773	0.43977
educacionmadrenoriesgo	-0.75292	0.50952	-1.478	0.13949
educacionpadrenoriesgo	0.72023	0.53034	1.358	0.17445
huertanoriesgo	0.76270	0.40827	1.868	0.06174 .
idiomasencasariesgo	1.42700	1.17432	1.215	0.22430
jugonoriesgo	0.03897	0.43944	0.089	0.92933
luznoriesgo	-32.57752	2415.54852	-0.013	0.98924
mamaderadiariesgo	0.27673	0.54843	0.505	0.61385
mamaderanocherriesgo	-0.01754	0.47463	-0.037	0.97052
mapucheapoderadoriesgo	-0.88426	0.71591	-1.235	0.21678
mapuchefamiliarriesgo	0.93026	0.68821	1.352	0.17647
pastanoriesgo	-0.59308	0.77649	-0.764	0.44499
placariesgo	1.23904	0.39102	3.169	0.00153 **
previsionnoriesgo	-0.81894	0.37573	-2.180	0.02929 *
ruralriesgo	0.38154	0.39139	0.975	0.32964
tipoviviendanoriesgo	-0.41115	0.35527	-1.157	0.24716

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 278.11 on 209 degrees of freedom

Residual deviance: 215.48 on 189 degrees of freedom

(123 observations deleted due to missingness)

AIC: 257.48

Number of Fisher Scoring iterations: 17

Elimino CONTROL MEDICO y LUZ porque hay menos de 10 casos

Call:

```
glm(formula = casocontrol ~ aguapotable + bebida + cepillado +
  controlodg + educacionmadre + educacionpadre + huerta + idiomasencasa +
  jugo + mamaderadia + mamaderanoche + mapucheapoderado + mapuchefamilia +
  pasta + placa + prevision + rural + tipovivienda, family = "binomial",
  data = df)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.6328	-0.9024	0.4549	0.8312	2.2886

Coefficients:

Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)

(Intercept)	-0.693444	1.263840	-0.549	0.583225	
aguapotablenoriesgo	0.132613	0.591596	0.224	0.822632	
bebidariesgo	0.731240	0.369799	1.977	0.047997	*
cepilladonoriesgo	0.165371	0.347599	0.476	0.634250	
controlodgnoriesgo	0.377305	0.410476	0.919	0.357997	
educacionmadrenoriesgo	-0.911999	0.511298	-1.784	0.074474	.
educacionpadrenoriesgo	0.566547	0.520573	1.088	0.276457	
huertanoriesgo	0.715832	0.405158	1.767	0.077262	.
idiomasencasariesgo	1.368426	1.156928	1.183	0.236884	
jugonoriesgo	-0.001372	0.436015	-0.003	0.997489	
mamaderadiariesgo	0.201594	0.533106	0.378	0.705319	
mamaderanocherriesgo	0.064310	0.459210	0.140	0.888625	
mapucheapoderadorriesgo	-0.877184	0.715586	-1.226	0.220264	
mapuchefamiliarriesgo	0.972095	0.689510	1.410	0.158588	
pastanoriesgo	-0.391262	0.733466	-0.533	0.593727	
placariesgo	1.273693	0.383686	3.320	0.000901	***
previsionnoriesgo	-0.880261	0.372445	-2.363	0.018105	*
ruralriesgo	0.271073	0.382587	0.709	0.478619	
tipoviviendanoriesgo	-0.363892	0.350282	-1.039	0.298872	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1					

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 278.11 on 209 degrees of freedom

Residual deviance: 221.26 on 191 degrees of freedom

(123 observations deleted due to missingness)

AIC: 259.26

Number of Fisher Scoring iterations: 5

Dejo solo placa, bebida, controlodg, huerta, mapuche y rural

Call:

```
glm(formula = casocontrol ~ placa + bebida + controlodg + huerta +
     mapuchefamilia + rural, family = "binomial", data = df)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.1381	-1.0197	0.5624	0.8281	1.9135

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.6561	0.4597	-3.603	0.000315	***
placariesgo	0.9907	0.3352	2.955	0.003126	**
bebidariesgo	0.8589	0.3431	2.503	0.012315	*
controlodgnoriesgo	0.4143	0.3635	1.140	0.254367	
huertanoriesgo	0.8298	0.3853	2.154	0.031274	*
mapuchefamiliariesgo	0.4546	0.3395	1.339	0.180556	
ruralriesgo	0.2863	0.3422	0.837	0.402799	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 278.11 on 209 degrees of freedom
 Residual deviance: 237.96 on 203 degrees of freedom
 (123 observations deleted due to missingness)
 AIC: 251.96

Number of Fisher Scoring iterations: 4

Dejo placa + bebida + huerta + mapuchefamilia + rural

Call:

glm(formula = casocontrol ~ placa + bebida + huerta + mapuchefamilia +
 rural, family = "binomial", data = df)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.1142	-1.0194	0.5071	0.8799	1.7847

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.3651	0.3748	-3.643	0.00027	***
placariesgo	1.0070	0.3335	3.020	0.00253	**
bebidariesgo	0.8440	0.3410	2.475	0.01332	*
huertanoriesgo	0.9042	0.3802	2.378	0.01741	*
mapuchefamiliariesgo	0.4682	0.3377	1.386	0.16561	
ruralriesgo	0.2635	0.3402	0.775	0.43860	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 278.11 on 209 degrees of freedom

Residual deviance: 239.25 on 204 degrees of freedom

(123 observations deleted due to missingness)

AIC: 251.25

Number of Fisher Scoring iterations: 4

Dejo placa + bebida + huerta + rural

Call:

```
glm(formula = casocontrol ~ placa + bebida + huerta + rural,
     family = "binomial", data = df)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.0591	-1.0364	0.5057	0.8048	1.7341

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.2521	0.3599	-3.479	0.000503	***
placariesgo	0.9676	0.3294	2.938	0.003305	**
bebidariesgo	0.9108	0.3352	2.718	0.006575	**
huertanoriesgo	1.0308	0.3692	2.792	0.005238	**
ruralriesgo	0.3348	0.3359	0.997	0.318919	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 278.11 on 209 degrees of freedom
 Residual deviance: 241.18 on 205 degrees of freedom
 (123 observations deleted due to missingness)
 AIC: 251.18

Number of Fisher Scoring iterations: 4

Extraigo los AIC para cada modelo

```
> library("AICcmodavg") # AIC corregido para muestras
> AICc(m1, return.K = FALSE)
[1] 252.5131
> AICc(m2, return.K = FALSE)
[1] 251.6661
> AICc(m3, return.K = FALSE) # mejor modelo
[1] 251.4718
```

```
> # Bondad del ajuste
> ## basado en la devianza
> anova(m00, m1, m2, m3, test = "Chisq")
```

Analysis of Deviance Table

Model 1: casocontrol ~ aguapotable + bebida + cepillado + controlodg +
 educacionmadre + educacionpadre + huerta + idiomasencasa +

jugo + mamaderadia + mamaderanoche + mapucheapoderado + mapuchefamilia +
pasta + placa + prevision + rural + tipovivienda

Model 2: casocontrol ~ placa + bebida + controlodg + huerta + mapuchefamilia +
rural

Model 3: casocontrol ~ placa + bebida + huerta + mapuchefamilia + rural

Model 4: casocontrol ~ placa + bebida + huerta + rural

	Resid. Df	Resid. Dev	Df	Deviance	Pr(>Chi)
1	191	221.26			
2	203	237.96	-12	-16.7022	0.1611
3	204	239.25	-1	-1.2937	0.2554
4	205	241.18	-1	-1.9254	0.1653

Ahora comenzando con todos

Analysis of Deviance Table

Model: binomial, link: logit

Response: df\$caso.o.control

Terms added sequentially (first to last)

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	Pr(>Chi)
NULL			209	278.11	
df\$edad	1	0.0010	208	278.11	0.9753866
df\$género	1	1.6812	207	276.43	0.1947606
df\$presenta.placa.dental	1	14.8549	206	261.57	0.0001161 ***
df\$cepillado.diario	1	1.6332	205	259.94	0.2012657
df\$usa.pasta.dental.fluorada	1	0.1230	204	259.82	0.7258437
df\$uso.de.mamadera.diurna.con.azúcar	1	0.0842	203	259.73	0.7716257
df\$uso.de.mamadera.nocturna.con.azúcar	1	0.0839	202	259.65	0.7720976
df\$ingesta.de.bebidas.carbonatadas.con.azúcar	1	8.6908	201	250.96	0.0031982 **
df\$ingesta.jugos.naturales	1	0.0000	200	250.96	0.9952301
df\$ha.asistido.a.control.odg.	1	2.2764	199	248.68	0.1313593
df\$huerta.con.alimentos.en.casa.	1	9.3129	198	239.37	0.0022754 **
df\$agua.potable.en.casa	1	0.9110	197	238.46	0.3398380
df\$luz.eléctrica.en.casa	1	4.2421	196	234.22	0.0394339 *
df\$previsión.salud.familiar	1	6.9387	195	227.28	0.0084352 **
df\$qué.idiomas.se.hablan.en.la.casa.	1	2.2168	194	225.06	0.1365149
df\$educación.padre.o.apoderado.masculino	1	1.3938	193	223.67	0.2377640
df\$educación.madre.o.apoderada.femenina	1	2.3669	192	221.30	0.1239299
df\$vivienda	1	0.8474	191	220.45	0.3573001
df\$grupo.familiar.se.reconoce.mapuche	1	0.6301	190	219.82	0.4273292
df\$apoderado..responsable.del.menor..se.reconoce.mapuche.	1	1.6742	189	218.15	0.1956943
df\$vive.en.campo.	1	0.7587	188	217.39	0.3837385

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1